

Liste les traitements à stopper avant scintigraphie à la MIBG
et délais suggérés après avis du médecin prescripteur:
Interruption des traitements (pendant 4 périodes biologiques):

1- Réduction de la captation de la MIBG :

Anti-hypertenseurs:

labétalol (trandate®)	21 jrs
réserpine (tensionorme®)	14 jrs

Anti-arythmiques:

amiodarone (cordarone®)	21 jrs
-------------------------	--------

Antidépresseurs tricycliques:

amitryptiline (laroxyl®)	7-14 jrs
Imipramine (tofranil®)	7-14 jrs

Antipsychotiques:

loxapine (loxapac®)	7-21 jrs
haloperidol (haldol®)	21 jrs

Antalgiques:

opiacés	7-14 jrs
tramadol (topalgic®, contrmal®, ixprim®, zaldiar®...)	7-14 jrs

Sympathomimétiques:

décongestionnants	7-14 jrs
bronchodilatateurs (ventoline®, bricanyl®...)	7-14 jrs
dopamine	7-14 jrs

cocaïne, phénothiazines

2- Prolonge la rétention de la MIBG :

Anti-hypertenseurs:

inhibiteurs calciques (nicardipine: loxen® , nifedipine:adalate®,amlodipine: amlor®)	14 jrs
IEC (captopril: lopril® ,enalapril: renitec®)	14 jrs