

UE 7 : PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE

## UE 7: PHYSIQUE & BIOPHYSIQUE

**RESPONSABLES:** Pr C WISNIEWSKI et D MARIANO-GOULART

Cours	35 (56%)	Compréhension
ED	28 (44%)	Manipulation, "
Tutorat	14 x 2h	Entraînement

**4 blocs fondamentaux en Physique**

Notions essentielles à toute poursuite d'études en santé, sciences physiques ou sciences pour l'ingénieur


12 heures de CM / 8 heures d'ED  
**Ondes et matière**  
 D Mariano-Goulart

**Mécanique des fluides**    **Transfert de chaleur**    **Transfert de matière**

10 heures de CM / 8 heures d'ED    3 heures de CM / 2 heures d'ED    10 heures de CM / 10 heures d'ED  
 C Wisniewski,    C Wisniewski    PO Kotzki

PASS T Ruiz & PO Kotzki

<http://scinti.edu.umontpellier.fr/enseignements/cours/>



UE 7 : PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE



## UE 7: EQUIPE PEDAGOGIQUE

	Prénom	Nom	Courriel	Responsable	Faculté (UFR)
ENSEIGNANTS DE COURS MAGISTRAUX	Christelle	WISNIEWSKI	christelle.wisniewski@umontpellier.fr	UE 7	Pharmacie
	Denis	MARIANO-GOULART	denis.mariano-goulart@umontpellier.fr	UE 7	Médecine
	Thierry	RUIZ	thierry.ruiz@umontpellier.fr		Pharmacie
	Pierre-Olivier	KOTZKI	Pierre-Olivier.kotzki@icm.unicancer.fr		Médecine
	Vincent	BOUDOUSQ	vincent.boudousq@umontpellier.fr		Médecine
	ENSEIGNANTS D'ENSEIGNEMENTS DIRIGES	Isabelle	COURET	i-couret@chu-montpellier.fr	Tutorat Montpellier (Médecine)
Laurent		VACHOUD	laurent.vachoud@umontpellier.fr	Tutorat Montpellier (Pharmacie)	Pharmacie
Catherine		LOZZA	catherine.lozza@umontpellier.fr	Tutorat Nîmes	Médecine
Carine		BECAMEL	carine.becamel@umontpellier.fr		Médecine
Emmanuel		DESHAYES	Emmanuel.Deshayes@icm.unicancer.fr		Médecine
Lidwine		GROSMOIRE	lidwine.grosmaire@umontpellier.fr		Pharmacie
Emilie		GUE	emilie.gue@umontpellier.fr		Pharmacie
Maxime		LOUET	maxime.louet@umontpellier.fr		Pharmacie
Laurent		MAIMOUN	laurent.maimoun@umontpellier.fr		Médecine
Eric		RONDET	eric.rondet@umontpellier.fr		Pharmacie
Emmanuelle		VARLET	emmanuelle.varlet@umontpellier.fr		Pharmacie

PASS

<http://scinti.edu.umontpellier.fr/enseignements/cours/>





ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## METHODE EN PHYSIQUE

Prête au vrai maintenant une **oreille attentive**,

*Quod super est, vacuas auris animumque sagacem*

Nette de tout souci, **aiguise ton esprit**,

*semotum a curis adhibe veram ad rationem,*

Et mes dons, apprêtés avec un soin fidèle,

*ne mea dona tibi studio disposta fideli,*

Garde d'en faire fi avant d'y rien **comprendre**,

*intellecta prius quam sint, contempta relinquo.*

Car je vais t'exposer les hautes lois du ciel


*nam tibi de summa caeli ratione deumque*

Et des dieux, dévoiler d'où **procèdent les choses**,

*disserere incipiam et rerum primordia pandam.*

De la nature des choses, Chant 1, vers 50-55

Traduction d'Olivier Sers, Belles lettres, Paris, 2012.



Lucrèce  
(1<sup>er</sup> siècle avant JC)

Modélisation mathématique la plus simple possible  
des mécanismes de la nature telle qu'elle est  
observée expérimentalement

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


## ONDE PROGRESSIVE: DEFINITION

Propagation d'une perturbation des caractéristiques physiques du milieu



modification locale de position, pression, température, champ électrique, magnétique,...

Exemple : propagation d'une modification périodique de la position verticale d'une corde



PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### ONDE PROGRESSIVE: CORDE VIBRANTE

Source d'énergie (baguette)

retard  $\tau = d/c$

$t=0$

$t=\tau$

$t=2\tau$


$t=3\tau$

$t=4\tau$

$c = d/\tau$

ONde progressive scalaire de vibration transversale

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### ONDE PROGRESSIVE: SON

Source d'énergie (corde ou surface vibrante, HP)

retard  $\tau = d/c$

$x,0$

$x,\tau$

$x,2\tau$

$x,3\tau$

$x,4\tau$

$c = d/\tau$

Son = Onde progressive scalaire de vibration ou de surpression longitudinale

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### ONDE PROGRESSIVE: LUMIERE

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot \sin(\omega \cdot t)$


retard  $\tau = d/c$

$x, 0$   
 $x, \tau = T/4$   
 $x, 2\tau$   
 $x, 3\tau$   
 $x, 4\tau = T$   
 $x, 5\tau$

$c = d/\tau$

Lumière  
= champ électromagnétique  
= Onde progressive vectorielle transversale

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### ONDE PROGRESSIVE: MODELISATION

$c$

$g(t, x=0)$   $g(t, x)$   $x$

$g(t, 0)$   $g(t, x)$


$g(\tau, 0)$   $g(\tau, 0)$





$0$   $\tau$   $t$   $x/c$   $\frac{x}{c} + \tau$   $t$





$g(\tau + \frac{x}{c}, x) = g(\tau, 0)$

$g(t, x) = g(t - \frac{x}{c}, 0)$

PASS








ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### SERIE DE FOURIER : CAS GENERAL

Pour toute fonction  $g(t)$  intégrable de période  $T=2\pi/\omega$ :

$$g(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos[(n\omega)t + \varphi_n]$$


J FOURIER 1768-1830


Les composantes de cette somme sont les **harmoniques** de fréquence  $f = \omega/(2\pi)$


Onde portant une fréquence unique: **sinusoïdale = pure = monochromatique = radiation**  
 Onde caractérisée par une somme d'harmoniques : **onde complexe = polychromatique**

Pour les plus curieux (*ces formules ne sont pas à apprendre par cœur*), on montre que les coefficients  $A_n$  et  $\varphi_n$  se calculent suivant :

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \text{ sauf } A_0 = \frac{a_0}{2} \quad \text{avec} \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cdot \cos(n\omega t) dt$$

$$tg \varphi_n = -\frac{b_n}{a_n} \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cdot \sin(n\omega t) dt$$

PASS 





ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### SPECTRE D'UNE ONDE COMPLEXE

$$g(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos[(n\omega)t + \varphi_n]$$

amplitude de l'harmonique →  $A_n$   
 harmonique n de fréquence  $f_n$   
 $f_n = n \cdot \omega / 2\pi = n \cdot f$

**Spectre discret** **Spectre continu**

PASS 






## CARACTERISTIQUES D'UNE RADIATION

$$g(t, x) = A \cdot \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right]$$

- **Célérité c**,  
dans ce cas, propagation dans la direction x positifs
- **Amplitude = A** (même unité que la grandeur g)
- **Pulsation propre** :  $\omega$  en rad/s
- **Fréquence f** en Hertz ( $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$ ) :  $\omega = 2\pi f$   
 $\omega$  ou f déterminent la nature de l'onde et ses modes d'interaction avec l'environnement...



## CARACTERISTIQUES D'UNE RADIATION


$$g(t, x) = A \cdot \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right]$$

- **Périodes**
  - Par rapport au temps :  $T = 1/f = 2\pi/\omega$  en s
    - Pour x fixé,  $g(t, x) = g(t+T, x)$
  - Par rapport à l'espace : **longueur d'onde**

$$A \cdot \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right] = A \cdot \sin \left[ \omega \left( t - T - \frac{x}{c} \right) \right] = A \cdot \sin \left[ \omega \left( t - \frac{cT + x}{c} \right) \right]$$

pour t fixé,  $g(t, x) = g(t, x + c \cdot T) = g(t, x + \lambda)$


- $\lambda = cT = c/f = 2\pi c / \omega$
- $\lambda$  est la distance parcourue par l'onde en T secondes.




## CARACTERISTIQUES D'UNE RADIATION

$$g(t, x) = A \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right] = A \sin [\omega t - \phi]$$

- **Phase** :  $\phi = \omega x/c = 2\pi f x/c = 2\pi x/\lambda$
- **Surfaces d'onde** : surfaces connexes contenant l'ensemble des points de même phase



PASS




## CARACTERISTIQUES D'UNE RADIATION

$$g(t, x) = A \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right] = A \sin [\omega t - \phi] = A \sin [\omega t - kx]$$

**Vecteur d'onde** :  $\vec{k}$

- perpendiculaire aux surfaces d'ondes
- de norme  $k = \omega/c = \phi/x$



PASS





## ONDE SPHERIQUE PURE

Une **source ponctuelle** émettant de façon **isotrope** produit une **onde sphérique** (dans un milieu homogène).

$$\phi = \frac{\omega}{c} d$$

Localement et loin de la source, la surface d'onde peut être approchée par un plan P : on parle alors d'**approximation en onde plane**



PASS


## ONDE SPHERIQUE PURE

Une **source ponctuelle** émettant de façon **isotrope** produit une **onde sphérique**.

A une distance d de la source, la puissance émise P se répartit uniformément sur la surface d'une sphère de rayon d :

$$I(\text{Wm}^{-2}) = \frac{P}{4\pi d^2}$$

La puissance surfacique reçue à la distance d varie donc comme  $1/d^2$



PASS

LOI EN 1/d<sup>2</sup>


A distance d d'une **source ponctuelle isotrope** :

$$I(Wm^{-2}) = \frac{P}{4\pi d^2}$$




Doubler la d diminue I d'un facteur 4


↳ Radioprotection




PASS




DIRECTION DE PROPAGATION



onde plane



onde sphérique



Pourquoi la forme des surfaces d'onde est-elle conservée au fil de la propagation ?


Qu'est-ce qui semble forcer une onde à se propager en ligne droite en milieu homogène, donc à suivre le chemin le plus court ?

PASS




## PRINCIPE DE HUYGENS-FRESNEL

**Principe de Huygens-Fresnel:** chaque point d'une surface d'onde agit comme une source ponctuelle émettant en phase




Surfaces d'ondes d'une onde sphérique

PASS



## PRINCIPE DE HUYGENS-FRESNEL

**Principe de Huygens-Fresnel :**  
chaque point d'une surface d'onde agit comme une source ponctuelle émettant en phase



Propagation d'une onde plane

PASS





Lors d'une petite propagation de l'onde, la surface d'onde se déplace donc dans la direction du vecteur d'onde en conservant sa forme (plane ou sphérique).

Reste à comprendre pourquoi sur un déplacement non microscopique, une onde se propage en ligne droite dans un milieu homogène.,,




## HUYGENS ⇒ PRINCIPE DE MOINDRE ACTION


**PMA: Le rayon lumineux réel choisit la trajectoire  $C_m$  parcourue en un temps  $t_m$  minimum.**  
 Mais comment ce rayon la trouve-t-il parmi tous les chemins  $C_i$  de phase  $\phi_i = \omega \cdot x_i / c = 2\pi \cdot t_i / T = 2\pi \cdot x_i / \lambda$  possibles ?


 Huygens-Fresnel ⇒  


$$A = A \cdot \sum_{\text{chemins } i} \sin\left[\omega\left(t - \frac{x_i}{c}\right)\right] = A \cdot \sum_{\text{chemins } i} \sin\left[\omega t - 2\pi \frac{t_i}{T}\right] = A \cdot \sum_{\text{chemins } i} \sin\left[\omega t - 2\pi \frac{x_i}{\lambda}\right]$$

Si  $\lambda \ll x_i$ , ou si  $T \ll t_i$ ,  $\phi_i$  change très vite de  $C_i$  à  $C_{i+1}$ : les contributions se détruisent mutuellement, **sauf si  $\phi_i$ ,  $t_i$  ou  $x_i$  sont des extrema (minima).**



Si  $\lambda \geq x_i$ : cf. diffraction

PASS



R Feynman 1918-1988

## ONDES COHERENTES

- Deux ondes de  $\lambda$  différentes ou dont la phase dépend du temps ne peuvent pas superposer leurs extrema de façon stable
  - Pour ces sources incohérentes, seules les intensités s'ajoutent
  - Exemple : lampe à incandescence
- Définition d'une onde cohérente :
  - Même longueur d'onde et déphasage constant dans le temps

$$g_1(t, x) = A \cdot \sin[\omega t - kx - \phi_1]$$

$$g_2(t, x) = A \cdot \sin[\omega t - kx - \phi_2]$$

$\phi_1, \phi_2$  indépendants de  $t$

- Particularité : Peuvent s'ajouter algébriquement (donc conduire à une onde somme d'intensité supérieure, égale ou inférieure aux ondes avant addition)

PASS




## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 1

- **Savoir définir** : onde progressive, onde pure, onde complexe, harmoniques, spectres et ondes cohérentes.
- **Savoir manipuler les caractéristiques d'une onde** :  $\omega$ ,  $f$ ,  $T$ ,  $\lambda$ ,  $\phi$ ,  $S_{\text{onde}}$ ,  $\vec{k}$
- **Savoir modéliser une onde pure** :
  - $g(t,x) = A.\sin[2\pi.f.(t-x/c)]$
  - Savoir manipuler ce modèle
- **Savoir utiliser le principe d'Huygens-Fresnel**
- **Savoir exploiter la loi en  $1/d^2$  à des fins de radioprotection**

PASS



## L'ONDE SONORE




PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## SON = ONDE DE PRESSION



~~$$c \gg x \Rightarrow g(t, x) = x + A \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right] \approx x + A \sin[\omega t]$$~~

PASS

Hypothèse  $c \gg x$ ,  
 $\Rightarrow$  retard =  $x/c \rightarrow 0$


$\downarrow$   
 vibrations en phase,  
 écarts conservés,  
 densité constante,  
 pression constante.

Or dans l'air,  
 $c \approx 343$  m/s  
 $\downarrow$   
 $c \approx x$   
 l'hypothèse  $c \gg x$   
 est fautive



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## SON = ONDE DE PRESSION



$$c \approx x \Rightarrow g(t, x) = x + A \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right]$$

PASS

déphasage des ondes  
 de vibration au  
 voisinage d'un lieu  $x$   
 $\downarrow$   
 onde de surpression  
 acoustique  $P$  qui s'ajoute  
 à la pression ambiante.

Ordres de grandeur

dans l'air :  $P_a = 10^5$  Pa  
 $P = 20 \mu\text{Pa} - 20$  Pa  
 $P \ll P_a$

dans l'eau :  $P < \text{kPa}$





ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## SON = ONDE DE PRESSION

$t_0=0$

$x$   $dx$

$t$

$E(t,x)$   $E(t,x+dx)$

$dx + E(t,x+dx) - E(t,x) = dx + \partial E$

**Compressibilité**

$$\chi = -\frac{1}{P} \frac{\Delta V}{V_0}$$

en Pa<sup>-1</sup>, exprimant la diminution relative de distance (ou de volume) par Pascal de surpression apporté


$$P = -\frac{1}{\chi} \frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{1}{\chi} \frac{\partial}{\partial x} \left[ A \cdot \sin \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right) \right] = \frac{A \cdot \omega}{\chi \cdot c} \cdot \cos \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right)$$

$$v = \frac{\partial}{\partial t} \left[ A \cdot \sin \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right) \right] = A \cdot \omega \cdot \cos \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right) \text{ vitesse de vibration}$$

$\Rightarrow P = \frac{1}{\chi \cdot c} \cdot v = Z \cdot v$

L'impédance acoustique Z du milieu (kg.m<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup>) caractérise sa capacité à transmettre un son

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## SON = ONDE DE PRESSION

On applique la relation fondamentale de la dynamique à une tranche de milieu de propagation de masse volumique  $\rho$ , de surface  $dS$  et d'épaisseur  $dx$ .

$\vec{F}_1$   $\vec{F}_2$

$x$   $x+dx$

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = F_1 - F_2 = [P(x) - P(x+dx)] \cdot dS = -\frac{\partial P}{\partial x} dx \cdot dS$$

$$P = Z \cdot v = Z \cdot A \cdot \omega \cdot \cos \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right) \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = -\frac{Z \cdot A \cdot \omega^2}{c} \sin \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right)$$

$$\Rightarrow m \cdot \frac{dv}{dt} = -\frac{Z A \omega^2}{c} \sin \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right) dx \cdot dS$$

mais  $v = A \cdot \omega \cdot \cos \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right) \Rightarrow \frac{dv}{dt} = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin \left( \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right)$ , donc


$$m = \rho \cdot dS \cdot dx = \frac{Z}{c} dx \cdot dS \Rightarrow \boxed{Z = \rho \cdot c}$$

Conséquence:  $Z = \rho \cdot c = \frac{1}{\chi \cdot c} \Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{\chi \cdot \rho}}$

pour de l'air à 20°C et 1 atm:  $\rho = 1,204 \text{ kg/m}^3$  et  $\chi = 7,04 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}$

$\Rightarrow c = 1/\sqrt{\chi \cdot \rho} = 343 \text{ m/s}$  et  $Z = \rho \cdot c = 413 \text{ kg.m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$

PASS




## RAPPELS MATHÉMATIQUES

## • PRODUIT SCALAIRE

$$(\vec{u}, \vec{v}) \rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

**Propriété:** si  $\|\vec{v}\| = 1$ , alors  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est la longueur de la projection de  $\vec{u}$  sur la direction de  $\vec{v}$




## • PRODUIT VECTORIEL

$$(\vec{u}, \vec{v}) \rightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} \perp \text{PLAN}(\vec{u}, \vec{v})$$

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$  direct



PASS




## RAPPELS ELECTRO ET MAGNETOSTATIQUE

**Champs statiques** (créés par des distributions de charges ou de courants électriques constants dans le temps). Exemples :


• Charge ponctuelle permanente  $\Rightarrow \vec{E}$ 

$$\|\vec{E}(r)\| = \frac{q'}{4\pi\epsilon r^2}$$


Permittivité:  $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 = \epsilon_r \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$

• Circuit de courant permanent  $\Rightarrow \vec{B}$ 

Perméabilité:  $\mu = \mu_r \mu_0 = \mu_r \cdot 12,57 \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$



$$\|\vec{B}(r)\| = \frac{\mu I}{2\pi r}$$




PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## LIEN ELECTRICITE / MAGNETISME

(Romagnosi 1802, Ørsted 1820)



$$\vec{F} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

$$\vec{F}' = -e(\vec{E}' + \vec{v}' \wedge \vec{B}')$$

Dans R fixe, champ  $(\vec{E}, \vec{B})$   
déplacement de charges dans  
un champ magnétique ( $\vec{v} = \vec{V}$ )  
sans champ électrique ( $\vec{E} = \vec{0}$ )


$$\vec{F} = -e \cdot \vec{V} \wedge \vec{B}$$

Dans R' mobile, champ  $(\vec{E}', \vec{B}')$   
charges statiques ( $\vec{v}' = \vec{0}$ ), donc  
pas de force magnétique :

$$\vec{F}' = -e \cdot \vec{E}'$$

donc  $\vec{E}' = \vec{V} \wedge \vec{B}$


PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


## COUPLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- Si les charges et les courants électriques ne dépendent pas du temps, ils créent des champs E et B permanents (statiques) et **indépendants l'un de l'autre**.
- Si les charges et les courants électriques varient au cours du temps, ils créent des champs électriques et magnétiques d'intensités variables dans le temps et **couplés**:
  - **Equations de Maxwell**: empiriques (fin XIX<sup>e</sup> siècle), puis conséquence théorique de la relativité restreinte (théorie des champs, début XX<sup>e</sup> siècle).



JC Maxwell 1831-1897

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**CONSEQUENCE DES EQUATIONS DE  
 MAXWELL 1 (Cf. Annexe 1)**

1- une onde électromagnétique (OEM) est une onde progressive **transversale** composée d'une paire **indissociable** de vecteurs champs électrique et magnétique  $(\vec{E}, \vec{B})$  d'intensités variables dans le temps.


2- Une OEM peut être créée par des charges des Courants électriques variables, par un champ électrique et/ou un champ magnétique variables dans le temps.

3- Les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  varient **en phase**, à la **même fréquence**, restent **orthogonaux** entre eux et à la direction de propagation  $\vec{u}$  de l'OEM :  $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{u}$

4- Les champs  $(\vec{E}, \vec{B})$  se déplacent à la célérité  $c_n$  et sont liés par la relation:

$$\vec{B} = \frac{1}{c_n} \vec{u} \wedge \vec{E}$$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**CONSEQUENCE DES EQUATIONS DE  
 MAXWELL 2 (Cf. Annexe 1)**

1- Les OEM se propagent dans un milieu (vide ou matériel) caractérisé par une **perméabilité**  $\epsilon$  et une **perméabilité**  $\mu$ .

2- La célérité des OEM dans le vide est la constante physique  $c$  :

$$c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 2,998.10^8 \text{ ms}^{-1}$$

3- La célérité des OEM dans un milieu matériel est  $c_n$  :

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r \epsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n}$$

4- Le rapport  $c/c_n$  est appelé **indice de réfraction** d'un milieu matériel :

$$n = \frac{c}{c_n} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} > 1$$

**Perméabilité**  $\mu = \mu_r \mu_0$


$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

**Permittivité**  $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$

$$\epsilon_0 = \frac{10^7}{4\pi c^2} \text{ F/m}$$

Indices 0 pour le vide, r = relatif

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### POLARISATION

Si la direction de  $\vec{E}$  (donc de  $\vec{B}$ ) est :

- fixe : polarisation rectiligne
- tourne à vitesse angulaire constante
  - en décrivant un cercle : polarisation circulaire
  - en décrivant une ellipse: polarisation elliptique

rectiligne      elliptique      circulaire

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### CLASSIFICATION SIMPLIFIEE

R. cosmique | U.V | visible | IR | micro ondes | hertzien

X,  $\gamma$  | | | | radar | TV, radio

| | | | Wifi | téléphone

| | | | | IRM

1 pm | 1 nm | 10 nm | 400-800 nm | 1mm | 1 m | 100 m | 1km  $\lambda$

f (Hz)  $\leftarrow$  10<sup>20</sup> | 10<sup>17</sup> | 10<sup>16</sup> | 10<sup>14</sup> | 10<sup>11</sup> | 10<sup>8</sup> | 10<sup>6</sup> | 10<sup>5</sup>

PASS




## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 2

- **Savoir définir** : une onde sonore comme onde de vibration ou de pression.
- **Savoir manipuler les caractéristiques d'une onde sonore** :  $c, Z, \chi \dots$
- **Savoir définir, modéliser une onde électromagnétique et manipuler**  $\vec{B} = \frac{1}{c_n} \vec{u} \wedge \vec{E}$
- **Savoir manipuler**  $n, \epsilon, \mu, \epsilon_r, \mu_r$
- **Connaitre les grands domaines du spectre électromagnétique**:  
X- $\gamma$ , < 10 nm, UV, V (400-800 nm), IR, H > mm



## LOIS DE PROPAGATION DE LA LUMIERE



## REFLEXION ET REFRACTION

Ces phénomènes peuvent être abordés de deux façons équivalentes. La première correspond à une approche « optique physique », la seconde à une approche « optique géométrique ».

- Conséquence des équations de Maxwell
- Conséquence du **principe de Fermat**
  - Principe de moindre action pour les ondes
  - **Entre deux points de l'espace, le vecteur d'onde suit la trajectoire la plus rapide<sup>1</sup>.**
  - Si le milieu est homogène, il s'agit de la trajectoire la plus courte.

PASS

<sup>1</sup>Pour une introduction, voir R. Feynman, « lumière et matière, une étrange histoire », Points Sciences




## PMA ⇒ LOI DE LA REFLEXION DE DESCARTES

Soit  $(OO')$  la médiatrice de  $[S', S'']$   
et  $S$  sur la droite  $(OS'')$ .


Le triangle  $(S'OS'')$  est isocèle.

$$\hat{a} = \hat{b} \Rightarrow \hat{\alpha} = \hat{\beta} \Rightarrow \hat{\alpha} = \hat{\gamma}$$

Les angles à la normale à  $(OO')$  de  
 $(SO)$  et  $(OS')$  sont donc égaux.



PMA: Le rayon lumineux réel choisit la trajectoire parcourue en un temps minimum, donc la plus Courte dans un milieu homogène.



Lors d'une réflexion sur un miroir placé dans un milieu homogène,  
les angles d'incidence et de réflexion sont égaux.

PASS




## CHEMIN OPTIQUE

- **Principe de Fermat** : La lumière suit la trajectoire qui minimise le temps de parcours  $t_n$  entre deux points A et B dans un milieu d'indice de réfraction  $n$  :

$$t_n = \frac{\text{dist}(A, B)}{c_n} \Rightarrow c.t_n = \frac{c}{c_n} . \text{dist}(A, B) = n . \text{dist}(A, B)$$

- **Chemin optique L entre deux points d'un milieu d'indice n**



$$L(A \rightarrow B) = n . \vec{u} . \vec{AB} \quad \text{où} \quad \vec{u} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}$$

- $L(A \rightarrow B)$  est la distance que parcourrait la lumière dans le vide dans le temps nécessaire à relier A à B dans un milieu d'indice  $n$  :


$$t_n = \frac{\text{dist}(A, B)}{c_n} = \frac{\text{dist}(A, B)}{c/n} = \frac{n . \text{dist}(A, B)}{c} = \frac{L}{c}$$

PASS



## VARIATION DE CHEMIN OPTIQUE

Supposons un petit déplacement de B en B' et calculons la petite variation de chemin optique (on néglige la modification de  $\vec{u}$ )



$$L' = n . \vec{u} . \vec{AB}' = n . \vec{u} . (\vec{AB} + \vec{dB})$$

$$L' = n . \vec{u} . \vec{AB} + n . \vec{u} . \vec{dB}$$

$$L' = L + n . \vec{u} . \vec{dB}$$

$$dL = n . \vec{u} . \vec{dB}$$

Si B subit un déplacement  $\vec{dB}$ ,  
L varie de :

$$dL = n . \vec{u} . \vec{dB}$$

projection  
de  $\vec{dB}$  sur  $\vec{u}$


PASS






ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA


### LOIS DE SNELL -DESCARTES




Quelles sont les directions du rayon réfléchi et du rayon transmis par rapport au rayon incident ?




Willebrord Snell  
1580-1626



René Descartes  
1596-1650

PASS 




ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### LOIS DE SNELL -DESCARTES (REFLEXION)

Fermat  $\Rightarrow dL(A \rightarrow M \rightarrow B) = 0$

$\vec{u}_i$  et  $\vec{u}_r$  coplanaires



$$dL(A \rightarrow M \rightarrow B) = 0$$


$$\Rightarrow n_1 \vec{u}_i \cdot d\vec{M} - n_1 \vec{u}_r \cdot d\vec{M} = 0$$


$$\Rightarrow \cos i' = \cos r'$$

$$\Rightarrow \sin i = \sin r$$

$$\Rightarrow i = r$$

Rayons incidents et réfléchis dans le même plan  
 $i = r$

PASS 



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA


### LOIS DE SNELL-DESCARTES (REFRACTION)

$dL(A \rightarrow M \rightarrow C) = 0$   
 $\vec{u}_i$  et  $\vec{u}_t$  coplanaires

$dL(A \rightarrow M \rightarrow C) = 0$   
 $n_1 \vec{u}_i \cdot d\vec{M} - n_2 \vec{u}_t \cdot d\vec{M} = 0$   
 $\Rightarrow n_1 \sin i = n_2 \sin t$

Rayons incidents et transmis dans le même plan  
 $n_1 \sin i = n_2 \sin t$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### LOIS DE SNELL -DESCARTES

La lumière suit la trajectoire qui minimise le temps de parcours :

Rayons incidents réfléchis et transmis dans le même plan

$i = r$   
 $n_1 \sin i = n_2 \sin t$


Conséquence :  $(n_1/n_2) \sin i = \sin t \leq 1 \Rightarrow \sin i \leq n_2/n_1$

$n_2 < n_1 \Rightarrow$  réflexion totale si  $i > \arcsin(n_2/n_1)$

PASS



## MODELISATION D'UN ŒIL HUMAIN



- **Dioptre** = frontière entre un espace transparent d'indice de réfraction  $n'$  et un autre d'indice  $n \neq n'$
- **Système optique** = milieu transparent contenant des miroirs ou des dioptres
  - Pas de miroirs = système **dioptrique**
  - Miroirs = système **catadioptrique**
- Système optique **centré** = admettant un axe de révolution

PASS




## MODELISATION D'UN ŒIL (HYPOTHESES)

### Approximation de Gauss :

- système optique centré,
- dont **les rayons lumineux s'écartent peu de l'axe**

Dans l'approximation de Gauss, le système optique est

- **stigmatique** si l'image de tout point A est un point A'
- **aplanétique** si l'image de tout segment AB perpendiculaire à l'axe est un segment A'B' perpendiculaire à l'axe



PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### FORMULE DE CONJUGAISON DU DIOPTRE SPHERIQUE

$n \cdot \sin(i) = n' \cdot \sin(i') \xrightarrow{\text{GAUSS}} n \cdot i = n' \cdot i'$   
 $\pi - i + \omega + \alpha = \pi \Rightarrow i = \omega + \alpha$   
 $\pi - \omega + i' + \alpha' = \pi \Rightarrow i' = \omega - \alpha'$

$n' - n = \frac{n'}{SA'} - \frac{n}{SA} \stackrel{\text{DEF}}{=} \Pi$   
 $\Pi$  puissance ou vergence en dioptrie ( $Dp = m^{-1}$ )  
 $\Pi > 0 \Rightarrow$  dioptre convergent  
 $\Pi < 0 \Rightarrow$  dioptre divergent  
 $\Pi = 0 \Rightarrow$  dioptre plan ou absent  
 $\Pi$  est additive

$n(\omega + \alpha) = n'(\omega - \alpha') \Rightarrow (n' - n)\omega = n\alpha + n'\alpha'$   
 $\alpha = -\frac{SP}{AS} = -\frac{SP}{SA}$      $\alpha' = \frac{PS}{A'S} = \frac{SP}{SA'}$      $\omega = \frac{PS}{CS} = \frac{SP}{SC}$   
 $\Rightarrow (n' - n) \cdot \frac{SP}{SC} = -n \frac{SP}{SA} + n' \frac{SP}{SA'}$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### CONSTRUCTION DES IMAGES

$\Pi = \frac{n' - n}{SC} = \frac{n'}{SA'} - \frac{n}{SA}$

**Dioptre sphérique convergent**

Un rayon parallèle à l'axe optique émerge en coupant l'axe au foyer image F' avec  $\Pi = n' / SF'$   
 Un rayon normal au dioptre passe par le centre sans être dévié (Descartes)

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### CONSTRUCTION DES IMAGES

$n$   $n' > n$

A objet B

S C F' F

A' image B'


$$\Pi = \frac{n'-n}{SC} = \frac{n'}{SA'} - \frac{n}{SA}$$

**Dioptre sphérique convergeant**

Un rayon parallèle à l'axe optique émerge en coupant l'axe au foyer image F' avec  $\Pi = n' / SF'$

Un rayon normal au dioptre passe par le centre sans être dévié (Descartes)

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### CONSTRUCTION DES IMAGES

$n$   $n' > n$

A objet B

S C F' F

A' image B'

$$\Pi = \frac{n'-n}{SC} = \frac{n'}{SA'} - \frac{n}{SA}$$


**Dioptre sphérique convergeant**

Un rayon parallèle à l'axe optique émerge en coupant l'axe au foyer image F' avec  $\Pi = n' / SF'$

Un rayon normal au dioptre passe par le centre sans être dévié (Descartes)

**Dioptre sphérique divergeant**


PASS




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### MODELE DE L'ŒIL REDUIT NORMAL

Cornée (42 Dp)  
+  
Cristallin (22 Dp +  $\delta$ )  
= 4 dioptries




$\cong 1$  dioptre convergent (60 Dp)  
La rétine est dans le plan focal image



$\Pi = \frac{n'-n}{SC} = 60 \text{ Dp} \Rightarrow SC = 6 \text{ mm}$   
 $\Pi = \frac{n'}{SF'} = 60 \text{ Dp} \Rightarrow SF' = 22 \text{ mm}$


**Œil réduit normal**

PASS




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### AMETROPIES SPHERIQUES



$\Pi = \frac{n'-n}{SC} = 60 \text{ Dp}$

**Œil réduit normal**



**MYOPE :**  
 $\Pi > 60 \text{ Dp}$  (R↓) ou L↑

**HYPERMETROPE :**  
 $\Pi < 60 \text{ Dp}$  (R↑) ou L↓

**Pathologie de la convergence**

PASS




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### CORRECTIONS DES AMETROPIES SPHERIQUES

**MYOPE**  
 - - - non corrigé  
 — corrigé

**HYPERMETROPE**  
 - - - non corrigé  
 — corrigé

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### REFLEXION NORMALE

g représente par exemple E ou B d'une OEM

$$g_i(t, x) = A_i \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{c_1}\right)\right]$$

$$g_r(t, x) = A_r \sin\left[\omega\left(t + \frac{x}{c_1}\right)\right]$$

$$g_t(t, x) = A_t \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{c_2}\right)\right]$$


$$\frac{\partial g_i}{\partial x}(t, 0) + \frac{\partial g_r}{\partial x}(t, 0) = \frac{\partial g_t}{\partial x}(t, 0)$$

$$\Rightarrow -\frac{\omega}{c_1} A_i + \frac{\omega}{c_1} A_r = -\frac{\omega}{c_2} A_t \Rightarrow A_i - A_r = \frac{c_1}{c_2} A_t$$

$$g_i(t, 0) + g_r(t, 0) = g_t(t, 0) \Rightarrow A_i + A_r = A_t$$

$$\Rightarrow A_i - A_r = \frac{c_1}{c_2} A_t = \frac{c_1}{c_2} (A_i + A_r) \Rightarrow 1 - \frac{A_r}{A_i} = \frac{c_1}{c_2} \left(1 + \frac{A_r}{A_i}\right) \Rightarrow \frac{A_r}{A_i} = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}$$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

## REFLEXION NORMALE

$$\left. \begin{aligned} \frac{A_r}{A_i} &= \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1} \\ c_i &= \frac{c}{n_i} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{A_r}{A_i} = \frac{\frac{c}{n_2} - \frac{c}{n_1}}{\frac{c}{n_2} + \frac{c}{n_1}} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$


En milieu homogène, l'intensité lumineuse est proportionnelle à  $A^2$ :

$$r = \frac{I_r}{I_i} = \left( \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

$$t = \frac{I_t}{I_i} = 1 - r$$

Ex: lentille en verre ( $n_2=1,5$ ) dans de l'air ( $n_1=1$ ) :  $r=4\%$   
 Conséquence: réflexion totale si  $n_2 \rightarrow \infty$  (soit  $n_2 \gg n_1$ )

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

## REFLEXION NORMALE TOTALE

$$\vec{E}_i(t, x) = \vec{E}_0 \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right] \quad \vec{E}_r(t, x) = -\vec{E}_0 \sin \left[ \omega \left( t + \frac{x}{c} \right) \right]$$

interférences:  $\vec{E}(t, x) = \vec{E}_i(t, x) + \vec{E}_r(t, x)$

$$\vec{E}(t, x) = \vec{E}_0 \left\{ \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c} \right) \right] - \sin \left[ \omega \left( t + \frac{x}{c} \right) \right] \right\}$$

Rappel:  $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$

donc:  $\vec{E}(t, x) = 2\vec{E}_0 \left\{ \sin \left[ -\frac{\omega x}{c} \right] \cos[\omega t] \right\}$

$$\vec{E}(t, x) = \left[ -2 \sin \left( \frac{\omega x}{c} \right) \vec{E}_0 \right] \cdot \cos(\omega t) = \vec{A}(x) \cdot \cos(\omega t)$$

PASS





ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### ONDE STATIONNAIRE

$$\vec{E}(t, x) = \left[ -2 \sin\left(\frac{\omega x}{c}\right) \vec{E}_0 \right] \cos(\omega t) = \vec{A}(x) \cos(\omega t)$$

P


Pas de déphasage

Amplitude

$$\vec{A}(x) = -2 \sin\left(\frac{\omega x}{c}\right) \vec{E}_0$$

variable avec x

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### ONDE STATIONNAIRE

P

$\Delta\phi = 0$


Pas de déphasage

Amplitude  $A(x)$  variable avec x


$$\sin\left(\frac{\omega x}{c}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{2\pi x}{cT} = \frac{2\pi x}{\lambda} = N\pi \Leftrightarrow x \in \left\{ 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, 3\frac{\lambda}{2}, \dots \right\}$$

$$\vec{E}(t, x) = \left[ -2 \sin\left(\frac{\omega x}{c}\right) \vec{E}_0 \right] \cos(\omega t) = \vec{A}(x) \cdot \cos(\omega t)$$

PASS



## ONDE STATIONNAIRE &amp; QUANTIFICATION



$$L = k\lambda/2$$

$$\lambda = 2L/k$$

k entier naturel

$$\vec{E}(t, x) = \left[ -2 \sin\left(\frac{\omega x}{c}\right) \vec{E}_0 \right] \cos(\omega t)$$

PASS

Si le milieu est limité de dimension L,  $\lambda$  ne peut prendre que certaines valeurs discrètes  $2L/k$  :

$$\lambda = 2L, L, 2L/3, L/2, \dots$$

On dit que ces grandeurs sont **quantifiées**



## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 3

## Savoir définir, caractériser et manipuler:

- Un chemin optique et le principe de Fermat
  - Calculs de chemins optiques dans diverses configurations
- Les lois de Descartes et la réflexion normale
  - Dans des contextes géométriques variés
- Les coefficients de réflexion et de transmission
- Onde stationnaire en lien avec la quantification
- L'approximation de Gauss, la relation de conjugaison du dioptre et ses applications dans la correction des amétropies sphériques


PASS



## DIFFRACTION

Au passage à travers un orifice de diamètre  $b \gg \lambda$ , l'hypothèse qui justifiait le PMA n'est plus valide.

Rappel du principe de Huygens-Fresnel : chaque point d'une surface d'onde agit comme une source ponctuelle émettant en phase,



Diffraction = changement de direction d'une onde au passage d'un écran percé d'un trou de diamètre  $b$  de l'ordre ou inférieur à la longueur d'onde.

Après l'écran :


- ① une ou plusieurs ondes sphériques se propagent.
- ② un déphasage apparaît entre les rayons émis dans une direction
- ③ les ondes cohérentes ré-émises peuvent s'additionner algébriquement = interférences

PASS




## INTERFERENCES

- **Définition : Addition algébrique d'ondes progressives pures cohérentes**
  - Attention : il ne s'agit pas simplement de l'addition des intensités des ondes (qui a lieu même avec des ondes incohérentes)
- Exemples :
  - Onde stationnaire après réflexion normale
  - Ondes sphériques après diffraction
  - Onde fractionnée avec décalage de phase



PASS

Miroirs réfléchissant et semi-réfléchissant



Bi-prisme et miroirs de Fresnel



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### INTERFERENCES DE 2 SOURCES COHERENTES

Rappel:  $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$

2 sources cohérentes

$$\vec{E}(t, r) = \vec{E}_0 [\sin(\omega t - \varphi_r) + \sin(\omega t - \varphi_r - \varphi)]$$

$$\vec{E}(t, r) = 2 \cdot \vec{E}_0 \sin\left(\frac{2\omega t - 2\varphi_r - \varphi}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\vec{E}(t, r) = \left[ 2 \cdot \vec{E}_0 \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right] \cdot \sin\left(\omega t - \varphi_r - \frac{\varphi}{2}\right)$$

(où  $\varphi_r = \frac{\omega r}{c}$ )

$$D = b \cdot \sin \theta$$

$$\varphi = \frac{\omega}{c} D = \frac{2\pi}{\lambda} D$$

$$\Rightarrow \varphi = 2\pi \frac{b \cdot \sin \theta}{\lambda} \text{ indépendant du temps } t$$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### INTERFERENCES DE 2 SOURCES COHERENTES

$$\vec{E}(t, r) = \left[ 2 \cdot \vec{E}_0 \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right] \cdot \sin\left(\omega t - \varphi_r - \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\varphi = 2\pi \frac{b \cdot \sin \theta}{\lambda}$$

Amplitude (donc intensité) maximum si  $|\cos(\varphi/2)|$  maximum, soit si  $\varphi/2$  multiple de  $\pi$

$$\frac{\varphi}{2} = \pi \cdot k \Rightarrow \frac{b \cdot \sin \theta}{\lambda} = k \Leftrightarrow \sin \theta = k \cdot \frac{\lambda}{b} \approx \theta$$

Succession de bandes claires et sombres → mesures de petits déplacements, astronomie

PASS



### INTERFERENCES APRES DIFFRACTION

Calcul du déphasage entre deux rayons distants de  $x$ , diffractés sous un angle  $\theta$  :


$$d\varphi = \frac{\omega}{c} dD = \frac{2\pi}{\lambda} dD$$

$$\Rightarrow d\varphi = \frac{2\pi \cdot \sin \theta}{\lambda} x = \Theta \cdot x$$

Dans la direction  $\theta$ , l'onde observée après diffraction est la somme de toutes les ondes déphasées ayant passé l'obstacle entre  $-b/2$  et  $+b/2$  et ayant été diffractées dans la direction  $\theta$  :

$$\vec{E} = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{\vec{A}_0}{b} \sin(\omega t - \Theta x) dx$$

PASS




### ONDE DIFFRACTEE (Cf. Annexe 2)

$$\vec{E} = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{\vec{A}_0}{b} \sin(\omega t - \Theta x) dx \quad \text{avec} \quad \Theta = \frac{2\pi \cdot \sin \theta}{\lambda}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{A}_0 \cdot \text{sinc}\left(\frac{\pi b \cdot \sin \theta}{\lambda}\right) \sin(\omega t)$$



Amplitude  $\vec{A}$   
maximale pour  
 $\pi \cdot b \cdot \sin \theta / \lambda = N \cdot \pi / 2$



$$\vec{A} = \vec{A}_0 \cdot \text{sinc}\left(\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}\right) = 0 \Leftrightarrow \sin \theta_{\min} = N \frac{\lambda}{b}, \quad N \text{ entier}$$

PASS





ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA


### DIFFRACTION PAR DES ECRANS

ORIFICE CARRE DE COTE  $b$   $\sin \theta_{\min}^N = N \cdot \frac{\lambda}{b}$

ORIFICE CIRCULAIRE DE DIAMETRE  $d$

$\sin \theta_{\min}^N = 1,22 \cdot N \cdot \frac{\lambda}{d}$   
N entier positif

PASS




ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### LA DIFFRACTION LIMITE LA RESOLUTION

$$\theta_{\min} \approx \sin \theta_{\min} = 1,22 \cdot \frac{\lambda}{d}$$

$$y_{\min} \approx f \cdot \theta_{\min} = f \cdot 1,22 \cdot \frac{\lambda}{d}$$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### LA DIFFRACTION LIMITE LA RESOLUTION


$x \leq f \cdot \theta_{\min}$  : fusion des 2 objets

$x > f \cdot \theta_{\min}$  : 2 objets vus

L'optique sépare les images de 2 objets distants de x si  $x > LMH = f \cdot \theta_{\min} = 1,22 \cdot \lambda \cdot f / d$


Rm :  $N = f/d =$  nombre d'ouverture des objectifs photographiques ( $f/2,8 > f/5,6 = d$ )  
 La diffraction dégrade plus la résolution pour  $N=5,6$  (d↓) que pour  $N=2,8$  (d↑)

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

### LA DIFFRACTION LIMITE LA RESOLUTION



L'optique sépare les images de 2 objets distants de  $x > LMH = f \cdot \theta_{\min}$   
 $LMH = R = \text{pouvoir séparateur} = \text{résolution}$

Pouvoir séparateur d'un instrument d'optique:  
 $R = 1,22 \cdot \lambda \cdot \frac{f}{d} = \frac{0,61 \cdot \lambda}{\sin \alpha}$   
 ou  $\frac{0,61 \cdot \lambda}{n \cdot \sin \alpha}$  si le milieu image est d'indice n

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha = \frac{\frac{d}{2}}{f} = \frac{d}{2f} \Rightarrow \frac{f}{d} \approx \frac{1}{2 \sin \alpha}$$

PASS Cf. cours d'UE2 sur la microscopie optique




ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA


### LA DIFFRACTION LIMITE LA RESOLUTION

Résolution angulaire =  $1,22 \cdot \lambda / d = \theta_{\min}$   
 Résolution spatiale =  $1,22 \cdot \lambda / d = 0,61 \cdot \lambda / (n \cdot \sin \alpha)$

- Pupille  $d = 5 \text{ mm}$ ,  $\lambda = 500 \text{ nm} \Rightarrow \theta_{\min} = 0,1 \text{ mrad}$ .  
 $R = n \cdot f \cdot \theta_{\min} = 29 \cdot 10^{-3}$ .  $\theta_{\min} = 3,6 \mu\text{m}$
- Microscope  $d = 1 \text{ cm}$ ,  $\lambda = 500 \text{ nm}$ ,  $n \cdot \sin \alpha = 1,5$   
 $\theta_{\min} = 61 \mu\text{rad}$  et  $R = 0,2 \mu\text{m}$
- Intérêt des optiques de **grand diamètre** (téléscopes)
- intérêt des faibles  $\lambda$  (rayons X ou  $\gamma$ , ...)
- Intérêt d'un milieu de **n élevé** entre la lame et le microscope




PASS Cf. cours d'UE2 sur la microscopie optique





ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

## RESOLUTION ET NUMERISATION



$R = f \cdot \theta_{\min}$


**Théorème d'échantillonnage de Shannon:**

Numérisation sans perte d'information  
 $\Updownarrow$   
 Dimension du pixel =  $R/2$

Exemple: calcul du diamètre optimal des cônes de la rétine:  $3/2 = 1,5 \mu\text{m}$

Données histologiques :  
 Bâtonnets :  $2 \mu\text{m}$  ; Cônes :  $1 \text{ à } 3 \mu\text{m}$


PASS Nb: la diffraction n'est pas la seule à limiter la résolution, cf. DFGSx2



ONDES SON OEM PROPAGATION (VISION) DUALITE ATOME X RA

## APPLICATIONS DE LA DIFFRACTION


- Holographie
- **Détermination des structures moléculaires**
  - $\sin \theta \approx \lambda/d$  donne l'ordre de grandeur de  $d$
  - La symétrie de la figure de diffraction reflète celle de l'objet diffractant
  - Rayons X :  $\lambda \approx \text{Å}$ , adaptés à sonder les structures moléculaires
  - L'analyse de Fourier des figures de diffraction générées par des molécules biologiques cristallisées permet d'en déduire la structure



R Franklin 1920-58  
 « photographie 51 »  
 RE Franklin & R Gosling,  
 Nature. 171,740-741. 1953


A structure of DNA  
 JD Watson & FHC Crick.  
 Nature. 171, 737-738. 1953  
 (parmi 5 articles)

PASS



## EXEMPLE DES FENTES D'YOUNG

On associe diffraction, sommation des rayons diffractés et interférences de ceux issus de chacun des deux trous




## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 4

### • Savoir :


- Définir des ondes cohérentes, interférence, diffraction.
- Évaluer si des interférences sont possibles
- Calculer un déphasage et une interférence dans des cas simples.
- Manipuler la relation  $\sin \theta_{\min} = N \cdot \lambda / b$
- en déduire les caractéristiques de résolution angulaire des instruments optiques et les conditions de numérisation.

ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## APPROCHE EXPERIMENTALE



↳ Pression de radiation: lumière  $\Rightarrow$  chocs de particules ?




X,  $\gamma$ , UV ( $f > 10^{14}$  Hz)

1905: effet photo-électrique seulement avec UV, X ou  $\gamma$


↳ Lumière = Particules dont l'énergie dépend de  $f$  ?

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## DUALITE ONDE-CORPUSCULE



$\vec{k} = \frac{\omega}{c_n} \vec{u}$

$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$  trajectoire suivie


*Problème* : modéliser ensemble les deux caractéristiques de la lumière :

- **ondulatoires** : réflexion, réfraction, diffraction, interférences...
- **corpusculaires** : chocs, effet photo-électrique, effet Compton...

*Idée* : Modéliser via le principe de moindre action et l'analogie entre :

- **ondulatoire** : surface d'onde / vecteur d'onde  $\vec{k}$
- **corpusculaire** : masse / quantité de mouvement  $\vec{p}$

PASS




## PRINCIPES DE MOINDRE ACTION

Aspect ondulatoire: principe de Fermat (1657)



1601-1665

PASS



$$C = \int_A^B n \cdot ds \quad \text{chemin optique minimal}$$

$$C = \int_A^B n \cdot ds = \int_A^B \frac{c}{c_n} \cdot ds = \int_A^B \frac{c}{c_n} \frac{\omega}{\omega} \cdot ds = \frac{c}{\omega} \int_A^B \frac{\omega}{c_n} \cdot ds = \frac{c}{\omega} \int_A^B \vec{k} \cdot d\vec{s}$$

$$\text{car } n = \frac{c}{c_n}$$




## PRINCIPES DE MOINDRE ACTION

Aspect ondulatoire: principe de Fermat (1657)



1601-1665

PASS




$$A = \int_A^B \vec{k} \cdot d\vec{s} \quad \text{minimale}$$




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### PRINCIPES DE MOINDRE ACTION

Aspect corpusculaire: principe de Maupertuis (1744)





1698-1769



$$A = \int_A^B \vec{p} \cdot d\vec{s} \quad \text{minimale}$$

Remarque:  
 $E_c \text{ constant} \Rightarrow \int_A^B \vec{p} \cdot d\vec{s} = \int_A^B m \cdot v \cdot ds = \int_A^B m \cdot v \cdot \frac{ds}{dt} \cdot dt = \int_A^B m \cdot v^2 \cdot dt = 2 \cdot E_c \int_A^B dt = 2 \cdot E_c (t_B - t_A)$


PASS 



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### PRINCIPES DE MOINDRE ACTION


$$A = \int_A^B \vec{k} \cdot d\vec{s}$$

$$A' = \int_A^B \vec{p} \cdot d\vec{s}$$


Description ondulatoire et corpusculaire de la lumière  
 $\Rightarrow A$  et  $A'$  minimaux ensembles

Il suffit d'avoir  $\vec{p}$  et  $\vec{k}$  proportionnels :  $\vec{p} = \hbar \cdot \vec{k}$

PASS 



## RELATION DE LOUIS DE BROGLIE

$$p = \hbar.k \Rightarrow p = \hbar \cdot \frac{\omega}{c_n} = \hbar \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{h}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Longueur d'onde (m) ONDE ↔ PARTICULE

quantité de mouvement de la particule (kg.m.s<sup>-1</sup>)

Constante de Planck  
 $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$  J.s  
 $\hbar = h/2\pi$



1892-1987

PASS



## APPLICATION NUMERIQUE

- Sujet de 70 kg se déplaçant à 10 km/h

$$\lambda = \frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{70 \cdot 10000/3600} = 3,4 \cdot 10^{-36} \text{ m} \ll 10^{-18} \text{ m (électron)}$$

- Électron accéléré sous 100 V

$$\frac{1}{2} m v^2 = e \cdot V \Rightarrow m^2 \cdot v^2 = 2 m e \cdot V \Rightarrow p = m v = \sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot V} = 5,4 \cdot 10^{-24} \text{ kg.m.s}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{5,4 \cdot 10^{-24}} = 1,2 \cdot 10^{-10} \text{ m} \approx \text{dimensions atomiques}$$

Donc : comportement ondulatoire (diffraction) des électrons

Les électrons  $\Rightarrow$   $\uparrow$  résolution des microscopes ( $\propto \lambda \downarrow / d$ )

mais ce comportement ne peut pas se manifester pour un humain ...


PASS




### 3 CONSEQUENCES DE LA DUALITE O.C

- Relation du quantum d'Einstein
  - Que signifie  $\lambda=h/p$  dans le cas d'un photon ( $m=0$  mais  $p \neq 0$ ) ?
- Relations d'incertitudes d'Heisenberg
  - Où comment le hasard entre en jeu du fait de la dualité onde-corpuscule
- Quantification des grandeurs physiques
  - Où l'on renonce à la continuité des grandeurs physiques

PASS



### RELATIVITE RESTREINTE



$$\left(\frac{c.t}{2}\right)^2 = \left(\frac{V.t}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \Rightarrow t^2(c^2 - V^2) = L^2 = c^2.t'^2 \Rightarrow t^2 = \frac{c^2.t'^2}{c^2 - V^2} = \frac{t'^2}{1 - \frac{V^2}{c^2}}$$

$$t = \frac{t'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \gamma.t' \text{ où } \gamma \geq 1$$

Exemple:  $V = 0,87.c \Rightarrow \gamma = 2$   
 Si vue de l'intérieur du train, l'horloge bat toutes les ns ( $t'=L/c=10^{-9}$ s), alors elle bat 2 fois plus lentement ( $t=2$  ns), vue du sol.

PASS



## IMPULSION & ENERGIE EN RELATIVITE


$$p = m \frac{dr}{dt'} = m \frac{dr}{dt} \frac{dt}{dt'} = m \frac{dr}{dt} \gamma \Rightarrow p = \gamma m v \quad \text{où} \quad \frac{dt}{dt'} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \gamma$$

En particulier,  $V = c \Rightarrow m = 0$

de plus, comme  $(1 - \epsilon)^n \stackrel{\epsilon \rightarrow 0}{\approx} (1 - n \cdot \epsilon)$

$$\gamma m c^2 = \frac{m c^2}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = m c^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \stackrel{V \ll c}{\approx} m c^2 \left(1 + \frac{V^2}{2c^2}\right) = m c^2 + \frac{1}{2} m V^2 = E$$

Donc, en généralisant :  $E = \gamma m c^2$




A Einstein  
1879-1955

$$E^2 = \gamma^2 m^2 c^4 = m^2 c^4 (1 + \gamma^2 - 1) = m^2 c^4 \left(1 + \frac{1}{1 - \frac{V^2}{c^2}} - 1\right) = m^2 c^4 \left(1 + \frac{\frac{V^2}{c^2}}{1 - \frac{V^2}{c^2}}\right) = m^2 c^4 (1 + \gamma^2 \frac{V^2}{c^2})$$

$$\Rightarrow E^2 = m^2 c^4 + m^2 c^2 \gamma^2 V^2 \Rightarrow E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2$$

PASS

En particulier,  $m = 0 \Rightarrow E = p \cdot c$



## RELATION DU QUANTUM

Comment appliquer la relation de L de Broglie à une particule (PHOTON) associée à une onde électro-Magnétique se déplaçant à la célérité de la lumière c ?

La relativité restreinte nous apprend que :

$$\begin{cases} M = \frac{m_{\text{repos}}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} & \text{donc } V = c \Rightarrow m_{\text{repos}} = 0 \\ E = p \cdot c & \text{si } m_0 = 0 \end{cases}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow E = \frac{hc}{\lambda} = hf = \hbar \cdot \omega \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

E : énergie du photon

$\omega$ , f et  $\lambda$ : pulsation, fréquence et longueur de l'OEM associée

c: célérité des OEM dans le vide; h: constante de Planck

PASS






ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### RELATION DU QUANTUM

$$E = \frac{hc}{\lambda} = hf = \hbar \cdot \omega \quad \text{où} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$


Électron-volt = énergie acquise par un électron accéléré sous 1 V :  
 $E = q \cdot V$  où  $q=e$  et  $V=1$   
 $1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$






$$E(\text{eV}) = \frac{hc}{e \cdot \lambda(\text{nm}) \cdot 10^{-9}} \Rightarrow E(\text{eV}) = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 2,998 \cdot 10^8}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot \lambda(\text{nm}) \cdot 10^{-9}}$$


$$E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$$

Attention : cette relation ne s'applique pas aux particules de masses au repos non nulles

PASS 



## RETOUR SUR LA DIFFRACTION




La même figure d'interférences est enregistrée sur une plaque photographique lorsque les photons sont émis un par un

Interprétation ?

PASS



## RETOUR SUR LA DIFFRACTION



Incertitude sur la position du photon :  $\Delta x = b$


Incertitude sur l'impulsion du photon :  $\Delta p_x = p \cdot \sin \theta$   
 si  $\theta$  petit et  $D \approx 1\text{ m}$ , alors  $p \cdot \sin \theta \approx p \cdot \theta \approx p \cdot \lambda/b$

Alors  $\Delta x \cdot \Delta p_x \approx b \cdot p \cdot \lambda/b = p \cdot \lambda = h \approx h/2\pi$

PASS



## RETOUR SUR LA DIFFRACTION



$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar \neq 0$$

L'incertitude sur la direction de diffraction de l'OEM se retrouve dans l'impossibilité de connaître avec une absolue précision à la fois la position et l'impulsion du photon



## RELATIONS D'INCERTITUDE D'HEISENBERG

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar$$

$\Delta E$  : énergie échangée lors d'une interaction de durée  $\Delta t$



1901-1976


Pour calculer une trajectoire à partir de la relation fondamentale de la dynamique ( $\Sigma f = ma$ ), il faut connaître exactement les positions et impulsions initiales, ce qui n'est pas le cas.

Donc, il n'y a pas de trajectoire définie à l'échelle des particules élémentaires, mais seulement des probabilités de présence p



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## QUANTIFICATION





$L = N \cdot \lambda/2$   $N$  entier

$\lambda/2$

Dualité Onde-particule  $\Rightarrow$  L. d'onde  $\lambda = 2 \cdot L/N$  quantifiée  
 $\Rightarrow$  fréquence  $f = c/\lambda = N \cdot c/(2L)$  quantifiée  
 $\Rightarrow$  Énergie =  $hf = N \cdot h \cdot c/(2L)$  quantifiée

Les grandeurs physiques ne varient pas continûment, mais par multiples d'une grandeur élémentaire: elles sont quantifiées.


PASS 



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## OBJECTIFS DU POINT D' ÉTAPE 5




- **Savoir expliquer** pourquoi une modélisation duale ondulatoire et corpusculaire entraîne :
  - $\lambda = h/p$  et  $E = hc/\lambda$  pour les particules de masses nulles
  - $\Delta x \cdot \Delta p_x$  borné inférieurement et la perte du concept de trajectoire
  - La quantification des grandeurs physiques
- **Savoir manipuler** :
  - Les relations  $\lambda = h/p$  et  $E = hc/\lambda$
  - Et les conséquences de  $E = hc/\lambda$  sur la classification des REM
- **Connaître**: les ordres de grandeur limites en énergie des photons :
  - (X, $\gamma$ ) :  $E > 10\text{-}100$  eV ; (visible) :  $E = 1\text{-}3$  eV; (Hertzien) :  $E < 1$  meV

PASS 



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

## LE MODELE STANDARD

**BOSONS DE JAUGE (INTERACTIONS)**

INTERACTION	BOSON	CIBLE	PORTEE fm	I/I <sub>1</sub>
FORTE	8 GLUONS	HADRON	1	1
ELECTRO-MAGNETIQUE	PHOTON	CHARGEE	∞	10 <sup>-3</sup>
FAIBLE	Z <sup>0</sup> , W <sup>+</sup> , W <sup>-</sup>	TOUTE	10 <sup>-3</sup>	10 <sup>-5</sup>
GRAVITATION	GRAVITON ?	MASSIQUE	∞	10 <sup>-38</sup>

**FERMIONS (MATIERE)**

6 quarks ← → 6 leptons


u	c	t	2e/3	e	μ	τ	-e
d	s	b	-e/3	ν <sub>e</sub>	ν <sub>μ</sub>	ν <sub>τ</sub>	0


+ 6 anti-quarks  
+ 6 anti-leptons

paaires/triplets :  
HADRONS  
↓  
ELECTRON  
e = 1,6 10<sup>-19</sup> Cb

proton = (uud)  $q = (\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3})e = e$   
neutron = (udd)  $q = (\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3})e = 0$

**ATOME = (p,n,e)**

PASS 



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


## MODELES ATOMIQUES


- Modèle atomique de Thomson
 

Z électrons de charge -e

charge +Ze uniforme


Atome neutre






THOMSON
- Expérience d'E. Rutherford (1911)
 


uranium  ${}_{84}^{210}\text{Po}$



1-2° suivant le modèle de Thomson


NAGAOKA 1904 RUTHERFORD

PASS Animation sciencesphy.free.fr 




## MODELES ATOMIQUES

- Modèle atomique de Thomson



- Modèle atomique d'E. Rutherford (1911)




PASS

Animation sciencesphy.free.fr




## MODELES ATOMIQUES

- Modèle atomique de Thomson



- Modèle atomique d'E. Rutherford (1911)



PASS


Animation sciencesphy.free.fr



## UNITES EN PHYSIQUE ATOMIQUE

### • Energie : électron-volt (eV)

- 1 eV = énergie cinétique acquise par un électron qui passe, dans le vide, d'un point à un autre ayant un potentiel supérieur de 1 volt



- $1 \text{ eV} = e \cdot V = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

### • Masse :

- **Unité de masse atomique** = u

- $1 \text{ u} = \frac{1}{12}$  masse d'un atome de carbone 12:  $1 \text{ u} = \frac{1}{12} \cdot \frac{12 \cdot 10^{-3}}{6,022 \cdot 10^{23}} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

- Au repos:  $E = m \cdot c^2 \Rightarrow m = E/c^2$  en **MeV** ou **MeV/c<sup>2</sup>**

$$1 \text{ u} = \frac{1,66 \cdot 10^{-27} \cdot (299\,792\,458)^2}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 931 \text{ MeV}$$

PASS




## MODELE ATOMIQUE DE RUTHERFORD

### • Atome : ${}^A_Z X$

- Z = numéro atomique = Nb d'électrons et de protons
- A = nombre de masse = Nb de nucléons ( $A=Z+N$ )
- $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \ll m_p = 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} < m_n = 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

- **ISOTOPE** : même Z *exemple* :  ${}^1_1 \text{H}$  et  ${}^2_1 \text{H}$
- **ISOBARE** : même A *exemple* :  ${}^{40}_{19} \text{K}$  et  ${}^{40}_{20} \text{Ca}$
- **ISOTONE** : même N *exemple* :  ${}^{26}_{12} \text{Mg}$  et  ${}^{27}_{13} \text{Al}$



- Dimensions des nucléons  $r \approx 1,4 \text{ fm}$

- Dimension du noyau  $R / \frac{4}{3} \pi R^3 \approx A \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow R \approx \sqrt[3]{A} \cdot r$

- $R < 257^{1/3} \cdot 1,4 < 10 \text{ fm} \Rightarrow$  interaction forte dans le noyau



PASS




### MODELE ATOMIQUE DE RUTHERFORD

- Défaut de masse :  $M({}_Z^AX) < Z.m_p + (A-Z).m_n$   
Le défaut de masse correspond à une énergie de liaison nucléaire par interaction forte


$$\Delta M = \frac{\Delta E}{c^2} = Z.m_p + (A-Z).m_n - M({}_Z^AX) > 0$$




PASS



### ENERGIES DE FISSION ET FUSION



PASS






## MODELE ATOMIQUE DE RUTHERFORD

- Un électron en orbite s'écraserait sur le noyau
  - mouvement accéléré (circulaire, de période  $T$ )
  - donc rayonne une onde électromagnétique  $f=1/T$  (antenne)
  - donc perd de l'énergie et  $T$  diminue  $\Rightarrow f \uparrow$



- et émettrait des fréquences continûment variables.



## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 6

- **Savoir définir :**
  - 4 interactions + hadrons ( $p, n$ ) + leptons ( $e, \nu$ )
  - Le modèle de Rutherford et ses limites
  - Isotope, isotone, isobare
- **Savoir manipuler**
  - Les unités atomiques de masse et d'énergie
  - Le défaut de masse  $\Delta M$




## MODELE ATOMIQUE DE BOHR

- Dualité onde-électron  $\Rightarrow$  quantification


$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

- Quantification :  $2\pi r = n\lambda$




$$2\pi r = k \frac{\lambda}{2}$$

$k$  entier impair



$$2\pi r = n\lambda$$

$k = 2.n$

hydrogénoïde :  $1e^-$ 

PASS



## MODELE ATOMIQUE DE BOHR

- Dualité onde-électron  $\Rightarrow$  quantification

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$


- Quantification :  $2\pi r = n\lambda$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = \frac{h}{mv} \\ 2\pi r = n\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow 2\pi r = \frac{nh}{mv}$$

$$\Rightarrow mvr = nh \text{ où } h = \frac{h}{2\pi}$$

- D'où la **quantification du M<sup>l</sup> cinétique** de l' $e^-$  :

$$\|\vec{L}\| = \|\vec{p} \wedge \vec{r}\| = mvr = n\hbar \text{ avec } n = 1, 2, \dots$$

hydrogénoïde :  $1e^-$ 

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### MODELE ATOMIQUE DE BOHR

- Dualité onde-électron  $\Rightarrow$  quantification
- Quantification : 
$$\left. \begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{mv} \\ 2\pi r &= n\lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2\pi r = \frac{nh}{mv} \Rightarrow mvr = nh \text{ où } h = \frac{h}{2\pi}$$
  - D'où la **quantification du M<sup>l</sup> cinétique** de l'e<sup>-</sup> : 
$$\|\vec{L}\| = \|\vec{p} \wedge \vec{r}\| = mvr = n\hbar \text{ avec } n = 1, 2, \dots$$
- RFD : 
$$\left. \begin{aligned} \frac{k}{r^2} &= \frac{mv^2}{r} \Rightarrow (mv)^2 = \frac{km}{r} \\ \text{mais } (mv)^2 &= \left(\frac{n\hbar}{r}\right)^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow r = n^2 \frac{\hbar^2}{km} = n^2 \cdot r_0$$

mais  $(mv)^2 = \left(\frac{n\hbar}{r}\right)^2$


$r_0 = \frac{0,53}{Z} 10^{-10} m$

quantification de rayon orbital

hydrogénoïde : 1e<sup>-</sup>

$k = \frac{Z \cdot e^3}{4\pi\epsilon_0} = 2,3 \cdot 10^{-28} Z$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### MODELE ATOMIQUE DE BOHR

- Energie cinétique de l'e<sup>-</sup> : 
$$\left. \begin{aligned} E_c &= \frac{1}{2}mv^2 \\ RFD \Rightarrow (mv)^2 &= \frac{km}{r} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_c = \frac{k}{2r}$$
- Energie potentielle de l'e<sup>-</sup> : 
$$E_p = -eV = -\frac{k}{r}$$
  - En prenant  $E_p(\infty) = 0$  
$$V = \frac{Z \cdot e}{4\pi\epsilon_0 r}$$

hydrogénoïde : 1e<sup>-</sup>

$k = \frac{Z \cdot e^3}{4\pi\epsilon_0} = 2,3 \cdot 10^{-28} Z$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### MODELE ATOMIQUE DE BOHR

- Energie cinétique de l'e<sup>-</sup> :
 
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$RFD \Rightarrow (mv)^2 = \frac{km}{r} \Rightarrow E_c = \frac{k}{2r}$$
- Energie potentielle de l'e<sup>-</sup> :  $E_p = -eV = -\frac{k}{r}$ 
  - En prenant  $E_p(\infty)=0$
- Energie de l'électron :  $E = E_c + E_p = -\frac{k}{2r}$ 


$$r = n^2 \frac{\hbar^2}{km} \Rightarrow E = -\frac{m}{2} \left(\frac{k}{\hbar}\right)^2 \frac{1}{n^2} \Rightarrow E = -\frac{me^4 Z^2}{8h^2 \epsilon_0^2 n^2}$$

$$k = \frac{Z \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0} = 2,3 \cdot 10^{-28} Z$$

$$E(eV) = -13,6 \cdot \frac{Z^2}{n^2}$$

hydrogénoïde : 1e<sup>-</sup>

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### MODELE ATOMIQUE DE BOHR

Pour un atome hydrogénoïde (i.e à un électron)

$$E_1(eV) = -13,6 \cdot Z^2$$


$$E_2(eV) = -\frac{13,6}{4} \cdot Z^2$$

$$E_3(eV) = -\frac{13,6}{9} \cdot Z^2$$

$$E_n(eV) = -13,6 \cdot \frac{Z^2}{n^2}$$

N. Bohr

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### MODELE ATOMIQUE DE BOHR

Pour un atome à plus d'un électron (Z=1)

**EFFET D'ÉCRAN :**  
la charge du noyau « vue »  
par l'électron périphérique  
semble diminuée de  $\sigma \cdot e$

$$E_{n,\sigma}(eV) = -13,6 \cdot \frac{(Z - \sigma)^2}{n^2}$$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### MODELE ATOMIQUE DE BOHR

Pour l'atome d'hydrogène  $^1_1\text{H}$

**EMISSION**  
d'un photon de  
fluorescence  
d'énergie  $E_\phi$

$$E_\phi = hf = \frac{hc}{\lambda} = |E_s - E_i|$$

$$E_s(eV) = -13,6 \cdot \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{4}\right)$$

$$E_i(eV) = 1,9$$

**ABSORPTION**  
d'un photon  
d'énergie  $E_\phi$

$$E_\phi = hf = \frac{hc}{\lambda} = |E_s - E_i|$$


$$E_s(eV) = -13,6 \cdot \left(\frac{1}{9} - 1\right)$$

$$E_i(eV) = 12,1$$

$E_1 = -13,6 \text{ eV}$   
 $E_2 = -3,4 \text{ eV}$   
 $E_3 = -1,5 \text{ eV}$

Conforme à la formule de **Balmer** (1885):  $\frac{1}{\lambda} = K \cdot \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)$


PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

**ENERGIE D'IONISATION**  $E_{n,\sigma}^i = -E_{n,\sigma}$ 


C'est l'énergie minimale nécessaire pour soustraire un électron atomique à l'influence électrostatique du noyau



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

**ENERGIE D'IONISATION**  $E_{n,\sigma}^i = -E_{n,\sigma}$ 

C'est l'énergie minimale nécessaire pour soustraire un électron atomique à l'influence électrostatique du noyau



## LIMITES DU MODELE DE BOHR

- Le modèle de Bohr est semi-classique
  - est validé expérimentalement sur  $^1_1\text{H}$  pour  $E_n (\text{eV}) = -13,6/n^2$ , mais pas pour  $\|\vec{L}\| = n\hbar$
  - notion de «trajectoire» de l'électron incohérente
- Du fait des inégalités d'Heisenberg :
  - pas de trajectoires
  - seulement des probabilités de présence de l'e<sup>-</sup>
- Comment déterminer cette probabilité p ? :
  - hypothèse: p liée à une fonction  $\psi$  associée à l'e<sup>-</sup>

PASS




## FONCTION D'ONDE ET EQUATION DE SCHRODINGER

- Interprétation de Copenhague (M. Born, 1926) :

La fonction d'onde  $\psi$  d'une particule détermine sa probabilité de présence en

un lieu  $dV$  à l'instant  $t$  :  $p = |\psi(x, y, z, t)|^2 dV$



- On montre que cette fonction  $\psi$  est solution de l'équation différentielle suivante :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(t, x)}{\partial x^2} + V \cdot \psi = E \cdot \psi$$

Equation de Schrödinger



E Schrödinger  
1887-1961

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### UNE APPROCHE DE L'EQUATION DE SCHRODINGER

Si on recherche  $\psi$  sous la forme d'une OPS  $\psi(t, x) = \sin[\omega t - k \cdot x]$  dont les caractéristiques  $(\omega, k)$  sont liées à celles d'une particule  $(E, p)$  par les relations de dualité:  $E = \hbar \cdot \omega$  et  $p = \hbar \cdot k$


$$\psi(t, x) = \sin[\omega t - k \cdot x] = \sin\left[\frac{1}{\hbar}(Et - p \cdot x)\right]$$


$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \psi(t, x)}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \psi(t, x) \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{p^2} \frac{\partial^2 \psi(t, x)}{\partial x^2} = \psi$$

$$p^2 = (mv)^2 = 2m \cdot \left(\frac{1}{2}mv^2\right) = 2m \cdot (E - V) \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m(E - V)} \frac{\partial^2 \psi(t, x)}{\partial x^2} = \psi$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(t, x)}{\partial x^2} + V \cdot \psi = E \cdot \psi \Rightarrow \psi \Rightarrow p = |\psi(x, y, z, t)|^2 dV$$

\*Attention: bien différencier  $\psi$  (densité de probabilité) de l'OEM  $(E, B)$  associée au photon

Exemple:   $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(n \cdot \frac{\pi x}{l}\right)$  et  $E_n = \frac{\hbar^2}{8ml^2} n^2$

PASS 




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### EQUATION DE SCHRODINGER

- En 3D,  $\psi$  et  $E$  dépendent de trois nombres entiers  $(n, l, m)$ : **nb. quantiques**
- Pour un électron dans un atome,  $V \propto \frac{1}{r}$  et  $\psi(n, l, m)$

	nombre quantique...	valeurs	grandeur quantifiée
n	principal	1, 2, ... (K, L, M, ...)	couche, énergie
l	secondaire	0, 1, ..., n-1 (s, p, d, f)	$\ \vec{L}\  = \ \vec{p} \wedge \vec{r}\  = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ sous-couche, énergie (via $\sigma$ )
m	magnétique	-l, ..., 0, ..., l	$L_z = m \cdot \hbar$
s	spin	$-\frac{1}{2}$ ou $+\frac{1}{2}$	$\sigma_z = s \cdot \hbar$


PASS 





### EQUATION DE SCHRODINGER



- Principe d'exclusion de Pauli (1925) :  
un seul électron par quadruplet (n,l,m,s)
- Pour la couche n :
  - $0 \leq l \leq n-1 \Rightarrow n$  sous-couches
  - $-l \leq m \leq l \Rightarrow 2l+1$  cases
  - $S = \pm 1/2 \Rightarrow 2$  électrons par case
  - au plus  $2.n^2$  électrons sur la couche n



PASS



### EQUATION DE SCHRODINGER



S. Haessler et al.  
Nature Physics 2010;  
6:200-206

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### MODELE ATOMIQUE

$$E_{n,l} = -\frac{me^4 (Z - \sigma(n,l))^2}{8h^2 \epsilon_0^2 n^2}$$

**FLUORESCENCE**  
émission d'un photon d'énergie  $E_\phi$

$$E_\phi = hf = \frac{hc}{\lambda}$$


$$= |E_{n,l} - E_{n',l'}|$$

**EXCITATION OU IONISATION**  
absorption d'un photon d'énergie  $E_\phi$

$$E_\phi = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$= |E_{n,l} - E_{n',l'}|$$

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### MODELE NUCLEAIRE

- Nucléons:  $\pm$  même **modèle en couches**,
- $E[n,l,j(m,s)]$ , j demi-entier pour quantifier les moments orbital et intrinsèque couplés des nucléons
- Un nucléon peut passer d'un niveau excité au niveau fondamental en émettant un **photon gamma ( $\gamma$ )**

142,6 keV

0 keV

99mTc 43

99Tc 43

142,6 keV 1,4%

140,5 keV 89,5% 0,08 nm

2,1 keV

PASS



## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 7

- **Connaître et savoir manipuler :**
  - Le modèle de Bohr-Sommerfeld
    - Remplissage des couches électroniques
  - Les énergies des électrons atomiques (hydrogénoïdes)

$$E_{n,l}(\text{eV}) = -13,6 \cdot \frac{(Z - \sigma(n,l))^2}{n^2}$$

- Les énergies d'ionisation, d'excitation, de fluorescence :

$$E_{n,l}^i = -E_{n,l}$$

$$E_{\uparrow n,l}^{n,l} = |E_{n,l} - E_{n,l'}|$$

$$hf = E_{\downarrow n,l}^{n,l} = |E_{n,l} - E_{n,l'}|$$

- Les niveaux d'énergie des nucléons



## RAYONNEMENTS IONISANTS

### Rayonnement ionisant, définition :

capable d'ioniser l'électron K de l'hydrogène.

Une particule est dite ionisante si son énergie dépasse **13,6 eV**

mais, **les énergies moyennes d'ionisation** sont plus élevées :

Dans l'eau : 32 eV

Dans l'air : 34 eV

**Les particules ionisantes** d'intérêt en santé sont :

Les neutrons, protons, électrons, alpha d'énergie > 13,6 eV  
et leurs antiparticules

Les photons X et  $\gamma$



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


## RAYONNEMENTS IONISANTS

$e^-$  et  $H^\bullet$  réducteurs

**• INCONVENIENT :**  
Ils peuvent briser des liaisons covalentes, donc produire des radicaux libres qui sont très réactifs peuvent dénaturer des molécules.  
Énergie moyenne d'une ionisation de l'eau : 32 eV

$OH^\bullet$  oxydant

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


## RAYONNEMENTS IONISANTS

$e^-$  et  $H^\bullet$  réducteurs


**• AVANTAGE :**  
Ils peuvent être utilisés pour irradier des cellules pathologiques (cancers, Hyperthyroïdie...).

$OH^\bullet$  oxydant

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PHOTONS IONISANTS**



• **AVANTAGE :**


Les photons ionisants peuvent traverser la matière, donc permettre de sonder l'intérieur d'un organisme

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**

- Dé-excitation d'électrons atomiques
  - **Fluorescence**, effet Auger, conversion interne
- Freinage d'électrons (bremsstrahlung)



PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**


- Dé-excitation d'électrons atomiques
  - Fluorescence, **effet Auger**, conversion interne
- Freinage d'électrons (bremsstrahlung)

① DE-EXCITATION & EMISSION D'UN QUANTUM

② IONISATION OU EXCITATION D'UN ELECTRON AUGER

③ FLUORESCENCE X

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**


- Dé-excitation d'électrons atomiques
  - Fluorescence, effet Auger, **conversion interne**
- Freinage d'électrons (Bremsstrahlung)

① EMISSION D'UN QUANTUM PAR LE NOYAU (Cf. RADIOACTIVITE)

② IONISATION OU EXCITATION


③ FLUORESCENCE X

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**


- Dé-excitation d'électrons atomiques
  - Fluorescence, effet Auger, **conversion interne**
- Freinage d'électrons (Bremsstrahlung)



Dans tous les cas donc, on observera un **spectre discret** de fluorescence permettant d'analyser la composition atomique massique d'un échantillon


ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**

- Dé-excitation d'électrons atomiques
- Freinage d'électrons (bremsstrahlung)
  - Particule chargée décélérée par interaction électrostatique avec noyaux de la cible: émission d'un REM
  - Energie rayonnée  $\propto a^2 \propto (Ze^2/mr^2)^2$  donc importante pour les  $e^-$
  - La fraction de l' $E_c(e^-)$  rayonnée augmente avec  $E_c(e^-)$  et  $Z^2$  (le reste de l' $E_c(e^-)$  perdue l'est sous forme d'excitations et de chaleur)




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**

- Dé-excitation d'électrons atomiques
- Freinage d'électrons (bremsstrahlung)
  - L' $E_c(e^-)$  peut être intégralement fournie à un unique photon ( $E_\phi = E_c$ ), ou fournie à plusieurs photons et perdue en partie sous forme de chaleur, d'où un **spectre continu** de rayonnement ( $0 < E_\phi < E_c$ )



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**


- Dé-excitation d'électrons atomiques
- Freinage d'électrons (bremsstrahlung)
  - L' $E_c(e^-)$  peut être intégralement fournie à un unique photon ( $E_\phi = E_c$ ), ou fournie à plusieurs photons et perdue en partie sous forme de chaleur, d'où un spectre continu de rayonnement ( $0 < E_\phi < E_c$ )
  - Ionisations au sein de la cible  $\Rightarrow$  **photons de fluorescence** en sus





ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**PRODUCTION DE RAYONS X**

- Dé-excitation d'électrons atomiques
- Freinage d'électrons (bremsstrahlung)
  - Applications : Le tube à rayons X des appareils de radiologie et les ostéodensitomètres bi-photoniques (DEXA).



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

**OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 8**

**Savoir définir et caractériser :**

- Un rayonnement ionisant ( $E > 13,6 \text{ eV}$ ;  $\lambda < 91 \text{ nm}$ )
- L'énergie moyenne d'ionisation de l'eau (32 eV)
- La dangerosité des rayonnements ionisants
  - ⇒ radicaux libres non spécifiques ⇒ altération de protéines
- L'intérêt des rayonnements ionisants
  - Thérapie, photons pénétrants (imagerie médicale)

**Connaître, savoir caractériser et manipuler :**

- Les modes de production des rayons X
  - Transitions électroniques et freinage
- Les spectres associés à ces phénomènes
- Les utilisations associés (tube à rayons X)

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**DESINTEGRATIONS RADIOACTIVES**

- **Transformation d'un noyau « père » X**  
 en un noyau « fils » Y :  ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_ZY + \text{particules}$
- Si noyau instable :  **$Z \neq N=A-Z$  ou  $Z \geq 84$**
- À condition :
  - D'un bilan énergétique positif :  **$E_d \geq 0$**
  - De la **conservation de la charge, de l'impulsion...**
- 50 isotopes radioactifs naturels (périodes longues)
- tous les isotopes artificiels sont radioactifs

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**DESINTEGRATIONS RADIOACTIVES**

- Classement par interaction impliquée
  - **Interaction forte** : radioactivité alpha ( $\alpha$ )
  - **Interaction faible** :
    - » radioactivité bêta ( $\beta$ )
    - » capture électronique
  - **Interaction EM** :
    - » radioactivité gamma ( $\gamma$ )
    - » conversion interne
    - » création de paires
- Loi de décroissance radioactive

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### RADIOACTIVITE ALPHA

- Emission d'un noyau d'hélium :
 
$${}^A_Z X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y + {}^4_2 \text{He}$$
- Energie disponible :
 
$$E_d = M(X).c^2 - [M(Y) + M(\alpha)].c^2$$

$$E_d = [M(X) - M(Y) - M(\alpha)].c^2$$


$$E_d = [\mathcal{M}(X) - Z.m_e - \mathcal{M}(Y) + (Z-2).m_e - \mathcal{M}(\alpha) + 2.m_e].c^2$$

$$E_d = \mathcal{M}(X).c^2 - [\mathcal{M}(Y) + \mathcal{M}(\alpha)].c^2$$
 avec  $\mathcal{M}({}^A_Z X) = M({}^A_Z X) + Z.m_e$  : masse atomique  
 et  $M({}^A_Z X)$  masse nucléaire
- $E_d \geq 0 \Rightarrow A > 150$  : concerne les isotopes lourds



Henri Becquerel  
1852-1908  
« Rayons uraniques »  
en 1896  
puis en 1898  
E Rutherford (α,β)

PASS




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### RADIOACTIVITE ALPHA


- Spectre de raie unique (approximation) :
 
$$m_\alpha v_\alpha = m_Y v_Y \Rightarrow (m_\alpha v_\alpha)^2 = (m_Y v_Y)^2 \Rightarrow E_Y = \frac{m_\alpha}{m_Y} E_\alpha$$

$$E_d = E_Y + E_\alpha = E_\alpha \left( 1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$
 donc :  $E_\alpha = \frac{m_Y}{m_Y + m_\alpha} E_d$



Énergie des α unique, précise, et de peu inférieure à E<sub>d</sub>

- Ordre de grandeur : E<sub>α</sub> ≈ 4-9 MeV, ionisant
- Applications : radiothérapie superficielle & métabolique Radium 223 (métas de prostate)



PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
 RADIOACTIVITE PAR INTERACTION FAIBLE

- Transformations **isobariques** : même A


$$Z > N = A - Z \Rightarrow \text{proton} \rightarrow \text{neutron}$$

$$Z < N = A - Z \Rightarrow \text{neutron} \rightarrow \text{proton}$$

- 3 types de radioactivité isobarique :


- radioactivité **bêta moins**
- radioactivité **bêta plus**
- **capture électronique**

PASS




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
 RADIOACTIVITE BETA MOINS

- Chadwick 1914 : émission d'électrons par des noyaux riches en neutrons




J Chadwick  
1891-1974




- Energie disponible :

$$E_d = M(X).c^2 - [M(Y) + M(e^-)]c^2 = \mathcal{M}(X).c^2 - \mathcal{M}(Y).c^2$$



Spectre de raies ?

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### RADIOACTIVITE BETA MOINS


- Chadwick 1914 : émission d'électrons par des noyaux riches en neutrons

${}^{210}_{83}\text{Bi} \rightarrow {}^{210}_{84}\text{Po} + {}^0_{-1}\text{e}$  soit  ${}_0^1\text{n} \rightarrow {}^1_1\text{p} + {}^0_{-1}\text{e}$

- Energie disponible :  $E_d = M(X).c^2 - [M(Y) + M(e^-)].c^2 = \mathcal{M}(X).c^2 - \mathcal{M}(Y).c^2$

**Spectre continu**

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### RADIOACTIVITE BETA MOINS

- Où est perdue l'énergie ?  
Ralentissement variable des  $e^-$  (1922, Meitner) ?

**Spectre continu**

1925, Ellis et Wooster : calorimétrie

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA


### RADIOACTIVITE BETA MOINS

- Où est perdue l'énergie ?  
1931, Pauli: émission d'une particule non détectée ?

- Anti-neutrino** :  $\bar{\nu}_e = \bar{\nu}$ 
  - Interaction/matière  $\approx 0$
  - charge nulle,  $v < \approx c$
  - $0,03 < m < 0,23 \text{ eV}$
  - observés en 1956

Spectre continu (pour l'e- et le  $\bar{\nu}$ )

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA

### RADIOACTIVITE BETA MOINS

- Emission d'un **électron** et d'un  $\bar{\nu}$  :  $\bar{\nu}$

$${}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + {}^0_{-1} e^- + {}^0_0 \bar{\nu}$$

$${}^1_0 n \rightarrow {}^1_1 p + {}^0_{-1} e^- + {}^0_0 \bar{\nu}$$

- Energie disponible :
 
$$E_d = M(X).c^2 - [M(Y) + M(e^-)].c^2$$

$$E_d = \mathcal{M}(X).c^2 - \mathcal{M}(Y).c^2 = E_{e^-} + E_{\bar{\nu}}$$



- Spectre **continu** pour l'électron, ionisant
- Applications : **Radiothérapie métabolique par l'e-**
  - Traitement antalgique des métastases osseuses ( ${}^{152}_{62}Sm, {}^{90}_{38}Sr$ )
  - Hyperthyroïdies ( ${}^{131}_{53}I$ )
  - Cancers thyroïdiens, cancers du foie.

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**RADIOACTIVITE BETA PLUS**



- Emission d'un **positron** et d'un **neutrino** par un noyau riche en protons :



- Energie disponible :

$$E_d = [M(X) - M(Y) - m_e] c^2 = [M(X) - M(Y) - 2m_e] c^2$$


- Spectre **continu** du positron



PASS

ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**RADIOACTIVITE BETA PLUS**


- Devenir du positron : **annihilation** entre matière et anti-matière



PASS


ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**RADIOACTIVITE BETA PLUS**

- Application :



Tomographie  
 par  
 Émission de  
 Positons (TEP)  
 =  
 Scintigraphie  
 de coïncidence



PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**CAPTURE ELECTRONIQUE**

- Capture d'un électron atomique K par un noyau riche en protons :

- En compétition avec β<sup>+</sup>



- Energie disponible :

$$E_d = [M(X) + m_e - M(Y)]c^2 - E_K^i$$

$$E_d = [M(X) - M(Y)]c^2 - E_K^i$$


PASS





ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**CAPTURE ELECTRONIQUE**

- Il s'ensuit l'émission de photons X de fluorescence caractéristiques de l'atome fils Y
- Application : dosage de protéines par Radio-Immuno-Array (RIA) via un comptage X
  - Application : comptage à 35 keV pour de  $^{125}\text{I}$  fixée sur la molécule à doser.



PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**RADIOACTIVITE PAR INTERACTION EM**


Il en existe 3 modes :

- Radioactivité gamma ( $\gamma$ )
- Conversion interne
- Création de paires

PASS



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**RADIOACTIVITE GAMMA (Villard 1900)**




- Emission d'un **photon** :


$${}^A_Z X^m \rightarrow {}^A_Z X + {}^0_0 \gamma$$


- Energie disponible :

$$E_d \approx E_\gamma = hf = \frac{hc}{\lambda} = [M({}^A_Z X^m) - M({}^A_Z X)]c^2$$

- Spectre **de raies**



PASS 




ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**RADIOACTIVITE GAMMA**

- Applications : le technétium 99m

$${}^{99m}_{43} Tc \xrightarrow{\gamma} {}^{99}_{43} Tc + {}^0_0 \gamma$$


– source :


$${}^{99}_{42} Mo \xrightarrow{\beta^-} {}^{99}_{43} Tc^m + {}^0_{-1} e^- + {}^0_0 \bar{\nu}$$






Scintigraphie d'émission mono-photonique :

Single Photon Emission Computed Tomography

- D'autres isotopes sont utilisés ( ${}^{123}_{53} I$ ,  ${}^{131}_{53} I$ ,  ${}^{81}_{36} Kr$ ,  ${}^{111}_{49} In$ ,  ${}^{201}_{81} Tl$  ...)

PASS 





## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 9


Pour chaque réaction radioactive :

### Savoir définir et caractériser

- La transformation nucléaire (équation de réaction)
- Le type ( $\alpha, \beta, \gamma$ ) et le mode ( $\beta^+, \beta^-, CE, CI, CP$ )
- Les conditions nécessaires à une désintégration
- Le spectre
- Les applications dans les domaines de la santé

### Savoir calculer et exploiter :

- Le bilan énergétique d'une réaction ( $E_d$ )
- L'allure du spectre




## LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE

- **N** = Nombre de noyaux radioactifs

$\lambda$  = proba. qu'un isotope se désintègre/sec

$$\lambda = (-dN/N)/dt, \text{ soit en moyenne } \bar{C} = -\Delta N = \lambda \cdot N \cdot \Delta t$$

- **P(C<sub>Δt</sub>=n)** : probabilité de mesurer  $n \neq \bar{C}$  photons issus de désintégrations dans un intervalle de temps  $\Delta t$



- Le phénomène de désintégration est aléatoire
  - **sans mémoire** : désintégrations indépendantes
  - **stationnaire** : proba(désintégration entre  $t$  et  $t+\Delta t$ ) ne dépend que de  $\Delta t$ , et pas de  $t$ .
  - **rare**  $\lambda \ll 1$


$\Delta t$   
 $\bar{C}$  photons  $\gamma$



ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE**

- Processus **sans mémoire, stationnaire, rare**

↕  
 Processus **POISSONNIEN**




$$\bar{C} = \lambda \cdot N \cdot \Delta t$$

comptage moyen sur un grand nombre d'expériences identiques

$$P(C_{\Delta t} = n) = e^{-\bar{C}} \frac{(\bar{C})^n}{n!}$$

$$P(C_{\Delta t} = n) = e^{-\lambda N \Delta t} \frac{(\lambda N \Delta t)^n}{n!}$$




S.D. POISSON  
 1781-1840

PASS

ONDES SON OEM PROPAGATION(VISION) DUALITE ATOME X RA  
**LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE**

- Processus **sans mémoire, stationnaire, rare**

↕  
 Processus **POISSONNIEN**



Propriété essentielle d'une statistique de Poisson :





$$\bar{C} = \lambda N \Delta t = \sigma^2$$

$$\Rightarrow \frac{S}{B} = \frac{\bar{C}}{\sigma} = \frac{\bar{C}}{\sqrt{\bar{C}}}$$

$$\frac{S}{B} = \sqrt{\bar{C}}$$

PASS





## LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE

- $N_0$  = nombre initial de noyaux radioactifs
- $N(t)$  = nombre de noyaux non encore désintégrés à t
- $\lambda$  = probabilité qu'un isotope se désintègre/sec

$$\lambda = -\frac{dN/N}{dt}$$

$$dN = -\lambda N dt \Rightarrow \frac{dN}{N} = -\lambda dt$$


en intégrant :  $\ln N = -\lambda t + K$

$$\text{soit } N(t) = e^{-\lambda t + K} = e^K e^{-\lambda t}$$

or  $N(0) = N_0$ , donc :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

PASS



## LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE



**Période** : durée moyenne nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux d'un échantillon

$$N(T) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T} \Rightarrow \ln 2 = \lambda T \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

PASS



$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$


$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0,69}{\lambda}$$

$$N(t) = N_0 e^{-\frac{\ln 2}{T} t}$$

$$N(t) = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}}$$



## LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE



Dix périodes sont nécessaires pour diminuer le nombre de noyaux radioactifs d'un facteur supérieur à 1000 ( $2^{10}=1024$ )

PASS



$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0,69}{\lambda}$$

$$N(t) = \frac{N_0}{2^{t/T}}$$

## LOI DE DECROISSANCE RADIOACTIVE

Vie moyenne  $\tau$  d'un isotope avant désintégration:

$$\tau = \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} t \cdot dN = \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} t \cdot \lambda N dt = \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} t \cdot \lambda N_0 e^{-\lambda t} dt$$

$$\tau = \lambda \int_0^{\infty} t \cdot e^{-\lambda t} dt$$


$$\text{Par parties}^* : \int_0^{\infty} t \cdot e^{-\lambda t} dt = \left[ -t \frac{e^{-\lambda t}}{\lambda} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} \left[ \frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\text{Donc : } \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T}{\ln 2} \approx 1,4 \cdot T$$

Pour le :  ${}^{99}_{43}\text{Tc}^m : \tau \approx 8,7 \text{ h}$

PASS

\* car  $[uv] = \int d(u \cdot v) = \int v \cdot du + u \cdot dv \Rightarrow \int u \cdot dv = [uv] - \int v \cdot du$





## ACTIVITE

- Activité = <sup>DEF</sup> nombre de désintégrations par seconde au sein d'un échantillon
- Unité SI: Becquerel (Bq) : 1 Bq = désintégration/sec.
- Autre unité: curie (Ci) : 1 mCi = 37 MBq

$$A(t) = \left| \frac{dN}{dt} \right| = \left| \frac{d}{dt} N_0 e^{-\lambda t} \right| = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$


- donc l'activité est proportionnelle à  $N(t)$ , nombre de noyaux non encore désintégrés :

$$A(t) = \lambda \cdot N(t)$$

PASS



## FILIACTIONS RADIOACTIVES



PASS




## OBJECTIFS DU POINT D'ÉTAPE 10

### Savoir :

- Définir une statistique de Poisson  
Aléatoire, sans mémoire, stationnaire, rare
- L'associer aux désintégration radioactives
- Caractériser sa variance = moyenne
- Caractériser un équilibre séculaire

### Savoir manipuler et utiliser :

- Les taux de comptages en scintigraphie ( $S/B = \sqrt{N}$ )
- La loi de décroissance :  $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 \cdot 2^{-t/T}$
- Les définitions de  $\lambda$ ,  $T$ ,  $\tau$ .
- L'activité en Bq :  $A(t) = \lambda \cdot N(t)$



Si vous avez la curiosité d'approfondir un peu ce cours, je vous conseille un ouvrage remarquablement bien adapté à l'étude de la physique pour des professionnels de santé :

Physique pour les sciences de la vie (tome 1: la physique et ses méthodes; tome 2: la matière; tome 3: les ondes)

A. Bouyssy, M. Davier, B. Gatty.

DIA Université. Belin, 1988.

**Je vous remercie pour votre attention**  
et vous souhaite tout le courage nécessaire pour la suite de l'année



# ANNEXES

Documents complémentaires destinés à satisfaire la curiosité des étudiants intéressés, non exigibles à l'examen.


PASS

## ANNEXE 1

### DENSITES DE CHARGES ET DE COURANTS

Soient  $n$  particules par unité de volume, de charge  $q$  et de vitesse  $\mathbf{v}$ . On définit :

- la densité de charge  $\rho = n \cdot q$  en  $\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$
- la densité de courant  $\mathbf{j} = n \cdot q \cdot \mathbf{v} = \rho \cdot \mathbf{v}$  en  $\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$



Le principe de conservation de la charge donne un lien entre ces deux densités :

$$\vec{j} = j \cdot \vec{e}_x \Rightarrow \frac{\partial j}{\partial x} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

PASS



## ANNEXE 1

## LES EQUATIONS DE MAXWELL

Un champ électromagnétique est caractérisé par un couple de vecteurs  $\vec{B}(B_x, B_y, B_z)$  et  $\vec{E}(E_x, E_y, E_z)$  satisfaisants:

- Charges électriques  $\Rightarrow$  champ électrique 
$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

- Pas de « charge » magnétique 
$$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

- Couplage électro-magnétique

Variation de  $\vec{B}$  dans le temps  $\Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix}$

Variation de  $\vec{E}$  dans le temps  $\Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B} = \epsilon\mu \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix}$

ou courant permanent

PASS




## ANNEXE 1

## LES EQUATIONS DE MAXWELL DANS LE VIDE

## APPLICATION :

- Soit une onde électrique

$$\vec{E}(t, x) = (0, 0, E_0 \sin \left[ \omega \left( t - \frac{x}{c_n} \right) \right])$$



- 1° relation de couplage de Maxwell :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \\ \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \\ \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \end{pmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} \Rightarrow B_x = B_z = 0 \text{ et } \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial B_y}{\partial t}$$

seul  $B_y$  est non nul

PASS



## ANNEXE 1

## LES EQUATIONS DE MAXWELL DANS LE VIDE

$$\vec{E}(t,x) = (0, 0, E_0 \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{c_n}\right)\right])$$

Maxwell  $\Rightarrow B_x = B_z = 0$  et

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{1}{c_n} \omega E_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{c_n}\right)\right]$$


$$\Rightarrow B_y = -\frac{1}{c_n} E_0 \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{c_n}\right)\right]$$

$$\vec{B}(t,x) = (0, -B_0 \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{c_n}\right)\right], 0)$$

$$\text{avec } B_0 = \frac{1}{c_n} E_0$$

Généralisation :  $\vec{B} = \frac{1}{c_n} \vec{u} \wedge \vec{E}$

PASS



## ANNEXE 1

## CELERITE DE LA LUMIERE

Dans notre cas particulier

$$\begin{cases} \vec{E}(t,x) = (0, 0, E_0 \sin[\omega(t - \frac{x}{c_n})]) \\ \vec{B}(t,x) = (0, -\frac{E_0}{c_n} \sin[\omega(t - \frac{x}{c_n})], 0) \end{cases}$$

4<sup>e</sup> équation de Maxwell (en l'absence de courant):

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \\ \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \epsilon\mu \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} \end{pmatrix} = \epsilon\mu \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\partial B_y}{\partial x} = \epsilon\mu \frac{\partial E_z}{\partial t}$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial x} = \epsilon\mu \frac{\partial E_z}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} \left( -\frac{E_0}{c_n} \sin[\omega(t - \frac{x}{c_n})] \right) = \epsilon\mu \frac{\partial}{\partial t} \left( E_0 \sin[\omega(t - \frac{x}{c_n})] \right) \Rightarrow \left( -\frac{\omega}{c_n} \right) \left( -\frac{E_0}{c_n} \right) = \epsilon\mu \omega E_0$$

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

PASS



## ANNEXE 2

## CALCUL DE L'ONDE DIFFRACTEE


$$\vec{E} = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{\vec{A}_0}{b} \sin(ax - \Theta x) dx = \frac{\vec{A}_0}{b} \frac{1}{\Theta} [\cos(ax - \Theta x)]_{-b/2}^{b/2}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{A}_0}{b} \frac{1}{\Theta} \left[ \cos\left(ax - \frac{\Theta b}{2}\right) - \cos\left(ax + \frac{\Theta b}{2}\right) \right] \text{ or } \cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p-q}{2} \sin \frac{p+q}{2}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{A}_0}{b} \frac{2}{\Theta} \sin\left(-\frac{\Theta b}{2}\right) \sin(ax) = \vec{A}_0 \sin(ax) \frac{\sin(\Theta b/2)}{\Theta b/2} \text{ avec } \Theta = \frac{2\pi \sin \theta}{\lambda}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{A}_0 \cdot \text{sinc}\left(\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}\right) \sin(ax)$$

Amplitude  $\vec{A}$   
maximale pour  
 $\pi b \sin \theta / \lambda = N \cdot \pi/2$



$$\vec{A} = \vec{A}_0 \cdot \text{sinc}\left(\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}\right) = \vec{0} \Leftrightarrow \sin \theta_{\min} = N \frac{\lambda}{b}, \text{ N entier}$$

PASS




# EXERCICES TYPES

PASS

EXERCICE : TF et aspects fréquentiels

EXERCICE D'APPLICATION



Connaissance  
Réflexion  
Les deux

A. Le point (0,0) est centre de symétrie du graphe du signal 1 (signal impair).

$$s1(t) = \sin(t) + \frac{1}{2}\sin(2t) + \sin(10t)$$


B. L'axe des ordonnées est axe de symétrie du graphe du signal 2 (signal pair).

$$s2(t) = \sin(t + \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{2}\sin(2t + \frac{\pi}{2}) = \cos(t) + \frac{1}{2}\cos(2t)$$

C. Le signal A peut correspondre au spectre 1.

D. Le signal 2 est le signal 1

PASS avancé de 1,57 secondes.



EXERCICE : Equation de D'Alembert

EQUATION DE D'ALEMBERT

Montrez que la connaissance de la fonction  $g(t,x)$  caractéristique d'une onde progressive périodique quelconque permet d'en déduire la célérité de cette onde.



Il suffit de le démontrer sur l'une des composantes harmoniques de l'OP qui s'écrit en toute généralité :  $g(t, x) = A \sin \left[ \omega \left( t \pm \frac{x}{c} \right) \right]$

Connaissance  
Réflexion  
Les deux

On calcule la dérivée partielle  $\frac{\partial g(t,x)}{\partial x}$  d'une fonction  $g(t,x)$  suivant la variable  $x$  est la dérivée de  $g$  par rapport à  $x$  calculée en supposant constante l'autre variable  $t$ .

La dérivée partielle seconde est notée :  $\frac{\partial^2 g(t,x)}{\partial x^2}$

$$g(t, x) = A \sin \left[ \omega \left( t \pm \frac{x}{c} \right) \right] \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x} = \pm \left( \frac{\omega}{c} \right) A \cos \left[ \omega \left( t \pm \frac{x}{c} \right) \right] \text{ et } \frac{\partial g}{\partial t} = \omega A \cos \left[ \omega \left( t \pm \frac{x}{c} \right) \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial x^2} = - \left( \frac{\omega}{c} \right)^2 \cdot g(t, x) \\ \frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial t^2} = - \omega^2 \cdot g(t, x) \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial t^2}$$

Equation de d'Alembert caractéristique d'une onde progressive, permet de calculer  $c$  à partir d'une modélisation de l'onde

PASS

EXERCICE: OEM


CONCOURS PACES 2011

Dans un milieu de propagation homogène, on considère une onde électromagnétique plane caractérisée par le champ électrique  $(E_x, E_y, E_z) = (0, 0, 100.\sin[628.(t-0,5.10^{-8}.y)])$  dans le repère orthonormé direct  $(O,x,y,z)$ .

Connaissance  
Réflexion  
Les deux

- A. Le champ électromagnétique se déplace le long de la direction y.  
 $E_z(t, y) = E_0 \sin[\omega.(t - \frac{y}{c_n})]$
- B. Le champ électromagnétique est une radiation de fréquence 100 Hz.  
 $\omega = 628 = 2\pi f \Rightarrow f = 100 \text{ Hz}$
- C. Le champ électrique est polarisé rectilignement suivant la direction y.  
Non, suivant z
- D. Les composantes en y et z du champ magnétique sont nulles à tout instant.  
 $\vec{B} = (1/c_n).\vec{u} \wedge \vec{E} \Rightarrow B_x(t, y) = B_0 \sin[\omega.(t - \frac{y}{c_n})]$
- E. L'indice de réfraction du milieu de propagation est 1,5.

$$\frac{\omega}{c_n} = \frac{2\pi f}{c_n} = 628,0,5.10^{-8} = \frac{628}{2.10^8} = \frac{2\pi.100}{2.10^8} \Rightarrow n = \frac{c}{c_n} = \frac{3.10^8}{2.10^8} = 1,5$$




PASS

EXERCICE: Chemin optique

CONCOURS PACES 2013

Comprendre que L est un « équivalent de distance dans le vide », au sens où :  $L = n.(AB) = \frac{c}{c_n}.(AB) \Rightarrow t = \frac{(AB)}{c_n} = \frac{L}{c}$



Connaissance  
Réflexion  
Les deux

- A. L'indice de réfraction des lames est  $n' = 2,4$   
 $n' = \frac{c}{c_n} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = \sqrt{5,76.1,000021} = 2,40$
- B. La célérité du rayonnement laser dans les lames est de  $2.10^8 \text{ m/s}$   
 $c_n = \frac{c}{n'} = \frac{3.10^8}{2,4} = 1,25.10^8 \text{ m/s}$
- C. La variation de chemin optique induite par l'introduction des deux lames est de 4,8 mm  
 $\Delta L = 2.(n'-1).e = 2,8 \text{ mm}$
- D. Après introduction des deux lames, la lumière arrive en B avec  $9.10^{-12} \text{ s}$  de retard  
 $\frac{2,8.10^{-3}}{c} = 9,3.10^{-12} \text{ s}$
- E. La variation de phase induite par l'introduction des deux lames est inversement proportionnelle à  $\lambda$ .  $\Delta\varphi = \frac{\omega}{c} \Delta L = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L$

PASS



EXERCICE: Lentille

CONCOURS PACES 2016-2017

Une lentille de verre ( $n=1,8$ ) est constituée d'un dioptre divergent de  $R_1=80$  cm et d'un dioptre plan. On considère que les sommets des 2 dioptres sont confondus (lentille mince).



Connaissance  
Réflexion  
Les deux

1- Donnez la formule de conjugaison de cette lentille

$$\left. \begin{aligned} \frac{n-1}{SC_1} &= \frac{n}{SA''} - \frac{1}{SA} \\ \frac{1-n}{SC_2} &= 0 = \frac{1}{SA'} - \frac{n}{SA''} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{n-1}{SC_1} = \frac{1}{SA'} - \frac{1}{SA}$$

2- Calculez la puissance de cette lentille

$$\Pi = \frac{n-1}{SC_1} = -\frac{0,8}{80 \cdot 10^{-2}} = -1 \text{ Dp} \quad (SC_1 = -R_1)$$


3- Calculez la focale image de cette lentille

$$\Pi = -1 = \frac{1}{SF'} \Rightarrow SF' = -1 \text{ m}$$

4- Calculez le grandissement d'un objet placé à 1 m en amont de cette lentille

$$G = \left| \frac{SA}{SA'} \right| = |\Pi \cdot SA + 1| = |(-1) \cdot (-1) + 1| = 2$$


PASS




EXERCICE: Amétropies

AMETROPIES SPHERIQUES

Quelle correction proposer à un patient myope qui voit flou tout objet situé au-delà d'un mètre de son œil ?



MYOPE non corrigé



MYOPE corrigé


Connaissance  
Réflexion  
Les deux

PASS



## EXERCICE: Diffraction &amp; résolution

## EXERCICE D'APPLICATION



Ecran éloigné où se forment les images de 2 sources identiques de  $\lambda = 500 \text{ nm}$  après traversée d'une fente carrée de largeur  $b = 0,5 \text{ mm}$ .

Connaissance  
Réflexion  
Les deux

- A. La distance entre le premier minimum et le maximum principal est de l'ordre de 1 mm.  
 $\sin \theta_{\min} = \frac{\lambda}{b} \approx \text{tg } \theta_{\min} = \frac{x_{\min}}{D} = x_{\min} = \frac{500 \cdot 10^{-9}}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ mm}$
- B. La largeur à mi-hauteur de la tache de diffraction (maximum principal) est de l'ordre de 1 mm.  
 $LMH \approx x_{\min} = 1 \text{ mm}$
- C. Si  $D = 3 \text{ m}$ , la distance entre les 2 maxima est de l'ordre de 3 mm.  
 $x = D \cdot \frac{\lambda}{b} = 3 \cdot 1 \text{ mm} = 3 \text{ mm}$
- D. Si  $D = 1 \text{ m}$ , Les 2 images seront indiscernables si  $d < 1 \text{ mm}$ .  
 Fusion des 2 pics d'intensité (intersection à plus de 50% de l'intensité maximale)...
- E. Si  $D = 3 \text{ m}$ , Les 2 images seront indiscernables si  $d < 1 \text{ mm}$ .

PASS

Indépendante du grandissement

## EXERCICE: Niveaux d'énergie des électrons atomiques

## EXERCICE D'APPLICATION

Les énergies d'ionisation de la raie K, d'une raie L et d'une raie M d'un atome à plusieurs électrons sont :

$$E_K = 3 \text{ keV}, \quad E_L = 0,3 \text{ keV} \quad \text{et} \quad E_M = 0,03 \text{ keV}.$$

Connaissance  
Réflexion  
Les deux

- A. La transition  $L \rightarrow K$  émet un photon X de  $\lambda = 0,46 \text{ nm}$ .  
 $|3 - 0,3| \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 4,32 \cdot 10^{-16} = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{4,32 \cdot 10^{-16}} = 0,46 \text{ nm}$
- B. La transition  $L \rightarrow M$  nécessite l'absorption d'un photon d'énergie 0,27 keV.  
 $|0,3 - 0,03| = 0,27 \text{ keV}$
- C. La transition  $M \rightarrow K$  émet un photon de fréquence  $718 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$ .  
 $|3 - 0,03| \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 4,752 \cdot 10^{-16} = h \cdot f \Rightarrow f = \frac{4,752 \cdot 10^{-16}}{6,62 \cdot 10^{-34}} = 717,8 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$
- D. La transition  $M \rightarrow L$  peut provoquer une ionisation sur la couche K.
- E. La transition  $L \rightarrow K$  peut provoquer une ionisation sur la couche M.

PASS

EXERCICE: Tube X

## Concours PACES 2011

Un tube à rayons X dont l'anode est en tungstène est utilisé avec une tension d'accélération des électrons de 150 kV.

Les énergies d'ionisation des couches K ( $n=1, l=0$ ), L ( $n=2, l=0$ ) et M ( $n=3, l=0$ ) de l'atome de tungstène sont respectivement 69,5 keV, 12,1 keV et 2,8 keV.

- A. L'énergie véhiculée par le rayonnement X produit est principalement le fait d'un rayonnement de freinage. Connaissance  
Réflexion
- B. Le spectre du rayonnement X produit est un spectre continu au sein duquel peuvent être observées des raies surajoutées d'énergie 66,7 keV et 57,4 keV. Les deux  
69,5-2,8 = 66,7
- C. L'énergie véhiculée par le rayonnement X produit est principalement le fait de photons de 9,3 keV. 69,5-12,1 = 57,4
- D. Une raie unique est observée à 9,3 keV dans le spectre du rayonnement X produit. 12,1-2,8 = 9,3  
pas unique
- E. S'il est focalisé sur un tissu humain vivant, le rayonnement X produit par ce tube est capable de créer des radicaux libres.
- F. L'énergie des photons émis varie entre 0 et 175 keV entre 0 & 150 keV
- G. Des photons X non ionisants prédominent dans le rayon X observé autoabsorbés

PASS

A

EXERCICE: Activité et période

## EXERCICE

Pour réaliser une scintigraphie osseuse, on administre par voie intraveineuse 3,8 ng de  $^{99}_{43}\text{Tc}^m$  ( $T = 6 \text{ h}$ ) à un patient.

1- Déterminer le nombre de moles de molybdène nécessaire à sa production

$$1 \text{ mole} \equiv 99 \text{ g} \Rightarrow 3,8 \text{ ng} \equiv \frac{3,8 \cdot 10^{-9}}{99} = 38,4 \cdot 10^{-12} \text{ moles de } ^{99}_{43}\text{Tc}^m \text{ ou de } ^{99}_{42}\text{Mo}$$

2- Déterminer l'activité injectée

$$38,4 \cdot 10^{-12} \text{ moles} = 23 \cdot 10^{12} \text{ atomes. } A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} N = \frac{\ln 2}{6 \cdot 60 \cdot 60} \cdot 23 \cdot 10^{12} = 741 \text{ MBq} = 20 \text{ mCi}$$

3- Déterminer la vie moyenne de ce radio-isotope

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T}{\ln 2} = 8,6 \text{ h} = 8 \text{ h } 39 \text{ min}$$

4- Quelle conséquence aurait l'administration d'une activité 4 fois plus faible

4 fois moins de photons détectés et S/B divisé par 2 (ou temps de pose x 2)

En supposant l'absence de toute élimination de cet isotope:

5- Combien de photons gamma seront émis dans l'organisme du patient ? 23,10<sup>12</sup>

6- Quelle % d'activité persistera 24h après l'injection ?

$$t = 24 \text{ h} = 4 \cdot T \Rightarrow A = \frac{A_0}{2^4} = \frac{A_0}{16} = 6,25\% \cdot A_0$$

PASS

A

EXERCICE: Capture électronique

**CAPTURE ELECTRONIQUE (PACES 2013)**

On observe l'apparition de manganèse  $^{55}_{25}\text{Mn}$  (masse atomique de 54,938 047 u) au sein de fer  $^{55}_{26}\text{Fe}$  (masse atomique 54,938 296 u), sans émission de particule chargée positivement ( $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$ ).

On donne:  $E_i^{1s}({}^{55}_{26}\text{Fe}) = 7,11 \text{ keV}$  et  $E_i^{1s}({}^{55}_{25}\text{Mn}) = 6,54 \text{ keV}$

$E_i^{2s}({}^{55}_{26}\text{Fe}) = 0,85 \text{ keV}$  et  $E_i^{2s}({}^{55}_{25}\text{Mn}) = 0,77 \text{ keV}$

$E_i^{2p}({}^{55}_{26}\text{Fe}) = 0,72 \text{ et } 0,71 \text{ keV}$  et  $E_i^{2p}({}^{55}_{25}\text{Mn}) = 0,65 \text{ et } 0,64 \text{ keV}$

Connaissance

Réflexion

Les deux

1- Ecrire la réaction en cause  ${}^{55}_{26}\text{Fe} + {}^0_{-1}e_K^- \rightarrow {}^{55}_{25}\text{Mn} + {}^0_0\nu$

2- Calculer l'énergie emportée par la particule émise

$$E_d = [\mathfrak{M}({}^{55}_{26}\text{Fe}) - \mathfrak{M}({}^{55}_{25}\text{Mn})] \cdot c^2 - E_K^i({}^{55}_{26}\text{Fe})$$

$$= [54,938296 - 54,938047] \cdot 931,5 - 7,11 \cdot 10^{-3} = 224,83 \text{ keV}$$

3- Calculer l'énergie des photons émis après la réaction

(hors Auger sur M)  $L1 \rightarrow K : 6,54 - 0,77 = 5,77 \text{ keV}$

$L2 \rightarrow K : 6,54 - 0,65 \text{ ou } 0,64 = 5,89 \text{ keV ou } 5,90 \text{ keV}$  Fluorescence X

PASS

$L2 \rightarrow L1 : 0,77 - 0,65 \text{ ou } 0,64 = 0,12 \text{ keV ou } 0,13 \text{ keV}$

